# Инструкция по применению
# Нитроксолин Авексима Таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг 50 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Ирбитский ХФЗ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Нитроксолин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 50 мг




## Действующее вещество

Нитроксолин

## Состав

1 таблетка содержит:Активное вещество: нитроксолин 50 мг.

## Форма выпуска

Таблетки

## Фармакокинетика

После приема внутрь в высокой степени абсорбируется из ЖКТ.Выводится почками в неизмененном виде. В моче определяются высокие концентрации нитроксолина.

## Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания преимущественно мочеполовых путей (в т. ч. пиелонефрит, цистит, уретрит, эпидидимит, инфицированная аденома или карцинома предстательной железы), вызванные чувствительными к нитроксолину микроорганизмами. Профилактика инфекционных осложнений при диагностических и лечебных манипуляциях (катетеризация, цистоскопия) в послеоперационном периоде при хирургических вмешательствах на почках и мочеполовых путях.

**Способ применения и дозы**

Для взрослых доза составляет 600-800 мг/сут. Кратность приема - 3-4 раза/сут с интервалом 6-8 ч. Курс лечения - 10-14 дней.Максимальная суточная доза составляет 1-1.2 г.Для детей доза составляет 10-30 мг/кг/сут в 3-4 приема.При хронических рецидивирующих процессах курс лечения составляет несколько месяцев.

**Противопоказания**

Нарушения функции почек, сопровождающиеся олиго- или анурией, тяжелые заболевания печени, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, катаракта, неврит, беременность, лактация, повышенная чувствительность к препаратам хинолинового ряда.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Нитроксолин противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

**Побочные действия**

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, потеря аппетита; в единичных случаях - нарушения функции печени.Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд.Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: в единичных случаях - атаксия, головная боль, парестезии, полиневропатия; при длительном применении описан случай развития неврита глазного нерва.Со стороны сердечно-сосудистой системы: в единичных случаях - тахикардия.

**Передозировка**

Тошнота, рвота,общая слабость.

**Взаимодействие с другими препаратами**

При одновременном применении препарата Нитроксолин с леворином и нистатином отмечается усиление эффекта Нитроксолина. Чтобы предупредить негативное воздействие на нервную систему, следует избегать применения комбинации Нитроксолина с нитрофуранами.Препарат Нитроксолин понижает эффективность налидиксовой кислоты.Одновременное использование антацидных препаратов, содержащих магний, замедляет всасывание Нитроксолина.Препарат Нитроксолин не следует использовать вместе со средствами, содержащими гидроксихинолины и их производные.

**Особые указания**

На фоне применения нитроксолина моча окрашивается в шафранно-желтый цвет.