Инструкция по применению
Нитросорбид-Озон Таблетки 10 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Изосорбида динитрат
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 10 мг



Описание

Таблетки Нитросорбид-Озон периферический вазодилататор с преимущественным влиянием на венозные сосуды. Антиангинальное средство.

Действующее вещество

Изосорбида динитрат

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Ишемическая болезнь сердца, профилактика приступов стенокардии, хроническая сердечная недостаточность, синдром легочной гипертензии.

Способ применения и дозы

При приеме внутрь разовая доза составляет 10-20 мг или назначается врачом индивидуально. обычно назначают по одной таблетке 2-3 раза в сутки. При необходимости суточная доза может быть увеличена до 40-50 мг (по 1 таблетке 4-5 раз в сутки).

Противопоказания

Выраженная артериальная гипотония (систолическое артериальное давление менее 90 мм рт. ст. , диастолическое артериальное давление менее 60 мм рт. ст.), коллапс, шок, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, констриктивный перикардит, тампонада сердца, токсический отек легких, состояния, сопровождающиеся повышением внутричерепного давления (в том числе геморрагический инсульт, черепномозговая травма), закрытоугольная глаукома. Повышенная чувствительность к нитратам. Применение Нитросорбида в периоды беременности и лактации возможно только тогда, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. При терапии нитратами нельзя употреблять силденафил.

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможны головокружение, головная боль, слабость, рефлекторная тахикардия, преходящая гиперемия лица, ощущение жара, артериальная гипотензия. в отдельных случаях - учащение приступов стенокардии (синдром обкрадывания). Со стороны пищеварительной системы: возможны тошнота, рвота, появление ощущения легкого жжения языка, сухость во рту. Со стороны центральной нервной системы: возможны сонливость, нечеткость зрения. редко - ишемия мозга и коллапс. Аллергические реакции: возможна кожная сыпь. Возможно появление толерантности к изосорбиду динитрату, а также перекрестной толерантности к другим нитратам .

Передозировка

Вследствие передозировки, как и при применении всех органических нитратов, может появляться ортостатическая гипотензия и рефлекторная тахикардия. В связи с этим можно ожидать наступления головных болей, приступов слабости, головокружения, сердцебиения, тошноты, рвоты, артериальной гипертензии. Возможно образование метгемоглобинемии. Терапевтические меры следует прежде всего направлять на повышение кровяного давления. В легких случаях достаточно уложить пациента, приподнять ему ноги. В более серьезных случаях, при коллаптоидном состоянии, необходимо проводить мероприятия по борьбе с шоком. Нужно восстановить объем циркулирующей крови (инфузия кровезаменителей или физиологического раствора). в исключительных случаях можно проводить инфузию норадреналина или допамина. При образовании метгемоглобина, в зависимости от тяжести состояния, врач может назначать такие антидоты для лечения метгемоглобинемии, как витамин С - 1 г перорально. метиленовый синий - до 50 мл 1 % раствора внутривенно. толуидиновый синий - первоначально 2-4 мг/кг массы тела внутривенно. кислородная терапия, гемодиализ, трансфузийная терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Одновременное применение вазодилататоров, блокаторов кальциевых каналов, бета-адреноблокаторов, трициклических антидепрессантов, алкоголя может усилить гипотензивное действие изосорбида динитрата. При одновременном применении симпатомиметических средств (адреналин, эфедрин, норадреналин, нафтизин, мезатон, изадрин) возможно снижение антиангинального эффекта изосорбида динитрата. Невозможно одновременное применение изосорбида динитрата и силденафила, который назначают при эректильной дисфункции, вследствие усиления антигипертензивного действия таблеток Нитросорбид.