Инструкция по применению
Нобазит Капсулы 250 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Авексима
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Энисамиум йодид
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 250 мг



Описание

Капсулы 250 мг: твердые желатиновые капсулы размера №1, непрозрачные, корпус и крышка оранжевого цвета. Содержимое капсул - порошок желтого или желтого с зеленоватым оттенком цвета. Допускаются вкрапления белого цвета.

Действующее вещество

Энисамиум йодид

Состав

В одной капсуле содержится: действующее вещество: N-метил-4-бензилкарбамидопиридиния йодид (энисамия йодид) (в пересчете на 100% безводное вещество) - 250 мг. вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 72,0 мг, тальк - 13,3 мг, кремния диоксид коллоидный - 1,7 мг, кальция стеарат - 3,0 мг. оболочка капсулы (корпус и крышечка): титана диоксид (Е171) - 1,3333%, краситель солнечный закат желтый (Е122) - 0,4418%, желатин - до 100%.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После приема внутрь энисамия йодид быстро попадает в кровь, максимальная его концентрация в крови наблюдается через 2-2,5 ч. Период полувыведения составляет 13,5-14 ч, метаболизируются в печени, но быстро выводится из тканей (период полувыведения составляет 2-3 часа). Выводится на 90-95 % с мочой в виде метаболитов.

Показания

Лечение гриппа и других ОРВИ у взрослых и подростков, в том числе и в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Лечение начинать при появлении первых признаков заболевания. Если через 3 дня лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Препарат НОБАЗИТ принимают внутрь после еды, не разжевывая. Максимальная разовая доза - 1,0 г, суточная - 2,0 г. Взрослым по 0,5 г 3 раза в сутки. Рекомендованный курс лечения от 5 до 7 дней. Детям с 12 лет по 0,25 г 3 раза в сутки на протяжении 7 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Детский возраст до 12 лет, беременность, период грудного вскармливания. Наличие аллергических реакций независимо от природы аллергена в анамнезе. Тяжелые органические поражения печени и почек.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение в период беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, включая кожные высыпания, крапивницу, ангионевротический отек, зуд. Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость и горький привкус во рту, отек слизистой оболочки полости рта, гиперсаливация, окрашивание языка в желтый цвет, тошнота, рвота, изжога, боль в животе, тяжесть в правом подреберье, диарея, вздутие живота. Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка, раздражение горла. В пострегистрационном периоде в единичных случаях отмечались следующие побочные реакции: головная боль, головокружение, слабость, колебание артериального давления. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При передозировке препарата возможно усиление побочных эффектов, описанных в соответствующем разделе. При их появлении проводят промывание желудка, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами достаточно не изучено. Препарат НОБАЗИТ усиливает действие антибактериальных и иммуномодулирующих средств. Целесообразным является комбинация данного препарата с аскорбиновой кислотой и другими витаминами. Также препарат НОБАЗИТ можно назначать одновременно с использованием рекомбинантного интерферона. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата НОБАЗИТ проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Следует с осторожностью назначать препарат пациентам с заболеваниями щитовидной железы, особенно при гипертиреозе.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Прием энисамия йодида не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Условия хранения

Хранить контурную ячейковую упаковку или банку в пачке, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.