Инструкция по применению
Нооредит Таблетки 100 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармасинтез
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фонтурацетам
Количество в упаковке: 1



Описание

Нооредит, 100 мг, таблетки Круглые плоскоцилиндрические таблетки от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, с риской с одной стороны и фаской. Линия разлома (риска) не предназначена для разламывания таблетки.

Действующее вещество

Фонтурацетам

Состав

Препарат Нооредит содержит Действующим веществом является: фонтурацетам. Нооредит, 50 мг, таблетки Каждая таблетка содержит 50 мг фонтурацетама. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, кальция стеарат. Нооредит, 100 мг, таблетки Каждая таблетка содержит 100 мг фонтурацетама. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, кальция стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Нооредит показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет. с целью улучшения состояния при заболеваниях ЦНС различного происхождения, сопровождающихся ухудшением интеллектуально-мнестических функций (комплекс нарушений интеллекта и памяти), снижением двигательной активности, при невротических состояниях, проявляющихся ухудшением памяти и нарушением процесса обучения, при психоорганических синдромах (симптомокомплекс, наблюдающийся при органических поражениях головного мозга (комплекс нарушений в результате патогенного воздействия какого-либо фактора на ткани головного мозга), сопровождается ухудшением памяти, снижением интеллекта и эмоциональной неустойчивостью), протекающих с интеллектуально-мнестическими нарушениями, при судорожных состояниях, при ожирении, вызванном перееданием и малоподвижностью (алиментарно-конституционального генеза), для профилактики гипоксии, повышения устойчивости организма к стрессу, коррекции функционального состояния организма в экстремальных условиях профессиональной деятельности, предупреждения развития утомления, повышения умственной и физической работоспособности, при хроническом алкоголизме с целью уменьшения интеллектуально-мнестических нарушений, Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза: Средняя разовая доза составляет 150 мг (от 100 до 250 мг), средняя суточная доза - 250 мг (от 200 до 300 мг). Максимальная суточная доза препарата Нооредит составляет 750 мг. Рекомендуется суточную дозу до 100 мг принимать однократно в утренние часы, а свыше 100 мг разделять на 2 приема. Для повышения работоспособности 100-200 мг однократно в утренние часы, в течение 2 недель (для спортсменов - 3 дня). Ожирение, вызванное перееданием и малоподвижностью (алиментарно-конституциональное) Рекомендуемая длительность терапии препаратом составляет 30-60 дней в дозе 100-200 мг 1 раз в сутки (в утренние часы). Путь и (или) способ введения Внутрь. Препарат Нооредит нужно принимать сразу после еды. Не рекомендуется принимать препарат позднее 15 ч. Продолжительность терапии Продолжительность лечения может варьировать от 2 недель до 3 месяцев, в среднем, 30 дней. При необходимости курс может быть повторен через 1 месяц.

Противопоказания

Не принимайте препарат Нооредит: если у Вас аллергия на фонтурацетам или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Применение препарата Нооредит во время беременности противопоказано. Не принимайте препарат Нооредит, если Вы кормите ребенка грудью.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Нооредит может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Ниже приведены нежелательные реакции, которые наблюдались у пациентов, принимавших фонтурацетам, частота возникновения которых неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно): бессонница (в случае приема препарата позднее 15 ч), двигательное беспокойство разной степени выраженности, часто сопровождающееся речевым возбуждением, также характерны: тревога, растерянность, гнев, злость, ярость, агрессивность, веселье и так далее (психомоторное возбуждение)*, покраснение кожных покровов*, ощущение тепла*, повышение артериального давления*. * данные нежелательные реакции наблюдались у некоторых пациентов в первые 1-3 дня приема. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств - членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Нооредит больше, чем следовало Если Вы приняли больше таблеток, чем следовало, незамедлительно сообщите об этом врачу. Если Вы забыли принять препарат Нооредит Если Вы забыли принять препарат Нооредит, примите пропущенную таблетку, как только Вы вспомните об этом, но не позднее 15 часов. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Есть некоторые лекарства, которые могут изменить действие препарата Нооредит, или их эффект может быть изменен препаратом Нооредит. Сообщите своему врачу, если Вы принимаете какие-либо другие лекарства. Фонтурацетам может усиливать действие препаратов, повышающих настроение, уменьшающих чувство усталости, повышающих физическую и умственную работоспособность (препараты, стимулирующие ЦНС), и препаратов, улучшающих интеллект, внимание и память (ноотропные препараты). Не принимайте препарат Нооредит с препаратами, применяемыми в лечении психических расстройств (нейролептики), поскольку это приводит к снижению их эффективности. При одновременном приеме препарата Нооредит с алкоголем и средством для неингаляционного наркоза (гексобарбитал), выраженность снотворного действия этанола и гексобарбитала уменьшается.

Особые указания

Препарат Нооредит содержит лактозу Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и механизмами, особенно в первые дни приема, учитывая возможное возникновение сонливости.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Храните препарат при температуре не выше 30 °С.