Инструкция по применению
Нормофлорин Б биокомплекс концентрат жидкий 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Бифилюкс
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Микроорганизмы в составе Биокомплекса генетически не модифицированы. Отсутствуют лактоза и белок коровьего молока. Полностью натуральный, без консервантов, красителей, адаптеров вкуса.

Состав

Бифидобактерии (B.bifidum, B . longum) не менее 10 млрд.микробных клеток в 1 мл.; продукты метаболизма бактерий: **органические кислоты** (в т.ч. молочная и янтарная),** аминокислоты** (в т.ч. незаменимые), микро- и макроэлементы, витамины, антимикробные вещества натурального происхождения; **пребиотик** лактит, стимулирующий рост защитной микрофлоры.

Форма выпуска

Раствор

Показания

* Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, постхолецитстэктомический синдром, целиакия, эрозивный гастрит) (в комплексной терапии); * Дисбактериоз и его профилактика; * Дерматиты различной этиологии (в комплексной терапии); * Искусственное вскармливание; * Синдром мальабсорбции, дисахаридазная (лактазная) недостаточность, пищевая аллергия (в комплексной терапии); * Женщинам в период беременности и кормлений грудью; * Частые респираторные инфекции, явления диатеза, рахита, анемии (в комплексной терапии); * Метаболический синдром и ожирение (в комплексной терапии); * Ишемическая болезнь сердца (в комплексной терапии); * Устранение дисбиотических нарушений кишечника у недоношенных детей; * Восстановление нарушенного микробиоценоза на фоне антибактериальной терапии.

Способ применения и дозы

Внутрь за 30 минут до еды 1-2 раза в день. Рекомендуется вместе с Нормофлорином®-Л для достижения лучшего терапевтического эффекта. * детям с рождения до 14 лет дозировка – по согласованию с врачом! Перед употреблением взбалтывать. Употреблять сразу. При повышенной кислотности можно разводить слабощелочной минеральной водой без газа. Вечерний прием можно заменить микроклизмой: разовую дозу препарата развести 1:1 кипяченой водой (до 370С) и ввести в прямую кишку на ночь. Курс 10-14 процедур.

Противопоказания

индивидуальная непереносимость компонентов.

Взаимодействие с другими препаратами

При антибактериальной терапии назначают с первого дня лечения, с интервалом 2-4 часа от приема антибиотика.

Особые указания

В короткие сроки **восстанавливает микрофлору кишечника**, участвует в метаболизме и усвоении организмом белков, жиров и углеводов, восстанавливает холестериновый и билирубиновый обмен; улучшает всасывание солей кальция и железа, витаминов Д, Р, улучшает синтез витаминов группы В; препятствует проникновению в организм эндотоксинов и развитию интоксикации, стимулирует выработку интерферонов и поддержанию общего пула иммуноглобулинов.

Условия хранения

в холодильнике, при температуре 4 ± 20С. 60 суток со дня изготовления, указанного на флаконе.