Инструкция по применению
Нормофлорин-Д Биокомплекс Концентрат жидкий 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Бифилюкс
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Нормофлорин®-Д является синбиотическим комплексом, в состав которого входит несколько штаммов лактобацилл и бифидобактерий, находящихся в физиологически активном состоянии в жидкой питательной среде. Обладает способностью сразу же после приема оказывать мощное антагонистическое действие по отношению к возбудителям многих инфекционных заболеваний благодаря эффектам, полученным в результате синергизма микроорганизмов в его составе, а также способностью воздействовать на лимфоидный аппарат кишечника. Уникальность и особенность Нормофлорина®-Д заключена в способности лакто- и бифидобактерий взаимодействовать и создавать вокруг себя среду, в которой в считанные минуты погибают сальмонеллы и шигеллы, стафило- и стрептококки, патогенные виды кишечной палочки и другие возбудители острых и хронических инфекций в организме. Кроме того, натуральные микробные метаболиты в высокой концентрации поддерживают и обеспечивают основные обменные процессы в организме. Нормофлорин®-Д не содержит молочного сахара и коровьего белка, и поэтому рекомендован людям, страдающим аллергией. В короткие сроки подавляет активность патогенной микрофлоры, препятствует проникновению в организм эндотоксинов; Восстанавливает защитную биопленку на всех слизистых, моторику кишечника; Снижает уровень холестерина и оксалатов; Расщепляет лактозу. Специально подобранные штаммы в составе Биокомплекса обладают выраженным иммуномодулирующим действием, снижают риск развития атопического дерматита за счет стимуляции выработки интерферонов и поддержанию общего пула иммуноглобулинов. Обладает менее выраженной кислотностью, что позволяет использовать его в программах лечения кислотозависимых заболеваний (язвенная болезнь, эрозивные поражения слизистых).

Состав

Лактобактерии (L.casei) не менее 1 млрд. микробных клеток в 1 мл. и бифидобактерии (B. longum, B. bifidum) не менее 100 млн. микробных клеток в 1 мл.; продукты метаболизма бактерий: органические кислоты, аминокислоты (в т.ч. незаменимые), микро- и макроэлементы, витамины, антимикробные вещества натурального происхождения; пребиотик лактит, стимулирующий рост защитной микрофлоры.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Дисбактериозы различного происхождения и их профилактика; острые и хронические кишечные инфекции и их профилактика; хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, дуоденит, язвенная болезнь, панкреатит, холецистит, гепатит, колиты, проктосигмоидит); диарея, в том числе на фоне антибактериальной, гормональной, лучевой и химиотерапии; до и после операции для восстановления микрофлоры; аллергические заболевания и иммунодефицитные со-стояния; обязательно после курса антибиотико- и химиотерапии; метаболический синдром и ожирение; в комплексной терапии атеросклероза и ИБС.

Способ применения и дозы

Детям с 6 до 12 месяцев по 3-5 мл (0,5-1 чайной ложке); детям с 1 года до 3 лет по 5-7 мл (1-1,5 чайной ложки); детям с 3 до 7 лет по 7-10 мл (0,5-1 столовой ложке); детям с 7 до 14 лет по 10-15 мл (1-1,5 столовой ложке); детям старше 14 лет по 15-20 мл (1,5-2 столовых ложки); взрослым по 20-30 мл (2-3 столовых ложки) 1-2 раза в день за 30 минут до еды. Продолжительность приема - 14-30 дней. Перед употреблением взбалтывать. Употреблять сразу. При повышенной кислотности можно разводить слабощелочной минеральной водой без газа.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Применение при беременности и кормлении грудью

Рекомендовано женщинам в период беременности и кормлений грудью.

Взаимодействие с другими препаратами

Нормофлорин®-Д устойчив к широкому кругу антибактериальных средств за счет свойств продуцентов, входящих в его состав. Промежуток между приемом антибиотиков и Нормофлорина®-Д должен быть не менее 3 часов.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранить в холодильнике при температуре от +2 до 8# 60 суток со дня изготовления, указанного на флаконе.