Инструкция по применению
Нормофлорин-Л Биокомплекс Концентрат жидкий 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Концентрат
Страна: Россия
Производитель: Бифилюкс
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Нормофлорин-Л - Биологически активная добавка к пище. В соответствии с сертификатом «Эффективные биокорректоры» № СДС.Б00021 от 12.07.07 г. эффективен в комплексной терапии язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, постхолецистэктомического синдрома, целиакии; метаболического синдрома и ожирения; ИБС, дерматитов различной этиологии. Восстанавливает нарушенный микробиоценоз на фоне антибактериальной терапии. Устраняет дибиотические нарушения кишечника у недоношенных детей. Эффективен в комплексной терапии детей с лактазной недостаточностью, эрозивным гастритом, пищевой аллергией. Эффективен в комплексной терапии вульвовагинита, кольпита, кандидоза и сальпингоофорита. Биокомплекс подавляет активность патогенной микрофлоры и выводит их токсины. Препарат восстанавливает перистальтику кишечника, снижает уровень холестерина и оксалатов, расщепляет лактозу, стимулирует синтез иммуноглобулинов, создает защитную биопленку на всех слизистых. Оказывает протективное действие на поврежденные клетки и улучшает метаболические процессы в организме. Дополнительные сведения. В производстве биокомплексов Нормофлорин Л не используются генетически модифицированные штаммы микроорганизмов. Они приготовлены на молочном гидролизате, в процессе производства протеины переходят в олигопептиды, дипептиды и аминокислоты (показаны при аллергии к белкам коровьего молока). Не содержат лактозы, консервантов, красителей, адаптеров вкуса. Загрязнители, нормируемые СанПин 2.3.2.1078-01, в биокомплексах Нормофлорин Л не обнаружены. Компоненты среды и сырья, применяемые при культивировании культур лактобактерий, являются разрешенными в качестве пищевых субстратов.

Состав

Лактобактерии (L.acidophilus) не менее 10 млрд. микробных клеток в 1 мл.; продукты метаболизма бактерий: органические кислоты (в т.ч. молочная и янтарная), аминокислоты (в т.ч. незаменимые), микро- и макроэлементы, витамины, антимикробные вещества натурального происхождения; пребиотик лактит, стимулирующий рост защитной микрофлоры.

Форма выпуска

Концентрат

Показания

Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, постхолецитстэктомический синдром, целиакия, эрозивный гастрит) (в комплексном лечении); Дисбактериоз и его профилактика; Дерматиты различной этиологии (в комплексном лечении); Искусственное вскармливание; Синдром мальабсорбции, дисахаридазная (лактазная) недостаточность, пищевая аллергия (в комплексной терапии); Женщинам в период беременности и кормлений грудью; Явления диатеза, рахита, анемии; Метаболический синдром и ожирение (в комплексной терапии); Ишемическая болезнь сердца (в комплексной терапии); У странение дисбиотических нарушений кишечника у недоношенных детей; Восстановление нарушенного микробиоценоза на фоне антибактериальной терапии Воспалительные заболевания рта и носоглотки; Бактериальные и грибковые заболевания урогенитального тракта (вульвовагинит, кольпит, кандидоз, сальпингоофорит) (в комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Внутрь, во время или через 1 ч после еды, 1–2 раза в сутки. Взболтать, развести в соотношении 1:2 и более любой пищевой жидкостью (не выше 37 °C) и сразу употребить. При повышенной кислотности можно разводить слабощелочной минеральной водой без газа. Детям: с рождения до 1 года — 3–5 мл (0,5–1 ч.ложка), с 1 до 3 лет — 5–7 мл (1–1,5 ч.ложки), с 3 до 7 лет — 7–10 мл (0,5 –1 ст.ложка), с 7 до 14 лет — 10–15 мл (1–1,5 ст.ложки), старше 14 лет — 15–20 мл (1,5–2 ст.ложки). Взрослым — по 20–30 мл (2–3 ст.ложки). Курсы приема: профилактический — не менее 14 дней, восстановительный — не менее 30 дней. Дерматология и косметология: марлевую салфетку пропитать 10–20 мл Нормофлорина®-Л, разведенного в соотношении 1:2 кипяченой водой, в виде аппликации наложить на кожу и выдержать до высыхания (не менее 15 мин), 1–2 раза в день. Курс — 10–14 дней. Стоматология и лор-заболевания. Полоскание рта и зева: 1–2 ст. ложки Нормофлорина®-Л на 0,5 стакана теплой кипяченой воды, полоскать каждые 2–3 ч в первые дни заболевания; орошать или смазывать миндалины раствором Нормофлорина®-Л, разведенным водой в соотношении 1:1. Закапывание в нос: 1 мл Нормофлорина®-Л развести водой в соотношении 1:2; детям — по 2–3 капли, взрослым — по 0,5 пипетки 2–4 раза в день. Курс — 3–7 дней. Акушерство и гинекология: одновременно биокомплексы Нормофлорины® принимаются внутрь по основной схеме, а также интравагинально в виде ватно-марлевого тампона, пропитанного Нормофлорином®-Л (7–10 мл развести 1:2 теплой, до 37 °C, кипяченой водой). Тампон устанавливается на 3–7 ч. Курс — 10–14 дней.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

При антибактериальной терапии назначают с первого дня лечения, с интервалом 2-4 часа от приема антибиотика.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

В холодильнике, при температуре 4±2 °C. Перед употреблением взбалтывать. Срок годности: 90 суток со дня изготовления.