Инструкция по применению
Но-шпа 40 мг 24 шт. таблетки

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Венгрия
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Дротаверин
Количество в упаковке: 24
Дозировка действующего вещества: 40 мг
Срок годности: 36



Описание

Но-шпа® таблетки — препарат при спазме и боли* в животе. Но-шпа® — таблетки при болях* в животе у взрослых и детей от 6 лет, которые помогают уменьшать болевые ощущения при спазме гладкой мускулатуры. Преимущества и особенности средства от спазма и боли в животе Но-шпа®:# Применяется у взрослых и детей старше 6 лет для лечения спазмов гладкой мускулатуры при заболеваниях желчевыводящих и мочевыводящих путей(1). # Используется в качестве вспомогательной терапии при спазмах гладкой мускулатуры ЖКТ, а также при менструальных болях (1). # Действует избирательно при боли в животе, не маскируя симптомы «острого живота» (2) # Обладает высоким профилем безопасности (3). # Обладает большой доказательной базой: более 50 клинических исследований с участием 13 500 пациентов.Перед применением проконсультируйтесь с врачом.*Боль, вызванная спазмом гладкой мускулатурыЛисток-вкладыш (информация для пациента) лекарственного препарата Но-шпа®,(РУ ЛП-№(002774)-(РГ-RU)). - показания; противопоказания и т.д. см. в государственном реестре лекарственных средств. Наиболее часто абдоминальные боли являются следствием спазма гладкомышечных элементов полых органов. Ивашкин В.Т. и др. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. Руководство для практикующих врачей – М.: Литтерра, 2003 – 1046.Tar A. et al. Safety profile of No-Spa Orv. Hetil 2002;11:559-562.

Действующее вещество

Дротаверин

Состав

1 таблетка содержитДействующие вещество:Дротаверин гидрохлорид - 40 мгВспомогательные вещества:магния стеарат - 3 мг,тальк - 4 мг,повидон - 6 мг, крахмал кукурузный - 35 мг,лактозы моногидрат - 52 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция. По сравнению с папаверином дротаверин при приеме внутрь быстрее и более полно абсорбируется из ЖКТ. После пресистемного метаболизма в системный кровоток поступает 65% принятой дозы дротаверина. Cmax в плазме достигается через 45–60 мин.;Распределение. In vitro дротаверин имеет высокую связь с белками плазмы (95–98%), особенно с альбумином, # и #-глобулинами.;Дротаверин равномерно распределяется по тканям, проникает в гладкомышечные клетки. Не проникает через ГЭБ. Дротаверин и/или его метаболиты могут незначительно проникать через плацентарный барьер.;Метаболизм. У человека дротаверин почти полностью метаболизируется в печени.;Выведение. T1/2 дротаверина составляет 8–10 ч.;В течение 72 ч дротаверин практически полностью выводится из организма. Около 50% дротаверина выводится почками и около 30% — через ЖКТ (экскреция в желчь). Дротаверин главным образом экскретируется в виде метаболитов, неизмененный дротаверин в моче не обнаруживается;

Показания

* Спазмы гладкой мускулатуры при заболеваниях желчевыводящих путей: холецистолитиаз, холангиолитиаз, холецистит, перихолецистит, холангит, папиллит * Спазмы гладкой мускулатуры мочевыводящих путей: нефролитиаз, уретролитиаз, пиелит, цистит, спазмы мочевого пузыря В качестве вспомогательной терапии * При спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, спазмы кардии и привратника, энтерит, колит, спастический колит с запором, синдром раздраженного кишечника с метеоризмом * При головных болях напряжения * При дисменорее (менструальных болях)

Способ применения и дозы

Взрослым назначают по 1-2 таб. на один прием 2-3 раза/сут. Максимальная суточная доза - 6 таб. (что соответствует 240 мг).;Клинических исследований с применением дротаверина с участием детей не проводилось.;В случае назначения препарата Но-шпа для детей в возрасте от 6 до 12 лет - по 40 мг (1 таб.) 1-2 раза/сут, для детей в возрасте старше 12 лет - по 4 мг (1 таб.) 1-4 раза/сут или по 80 мг (2 таб.) 1-2 раза/сут. Максимальная суточная доза - 160 мг (4 таб.).;При приеме препарата без консультации с врачом рекомендованная продолжительность приема препарата обычно составляет 1-2 дня. В случаях, когда дротаверин применяется в качестве вспомогательной терапии, продолжительность лечения без консультации с врачом может быть больше (2-3 дня). Если болевой синдром сохраняется, пациенту следует обратиться к врачу.;При использовании флакона с полиэтиленовой пробкой, снабженной штучным дозатором: перед использованием следует удалить защитную полоску с верхней части флакона и наклейку со дна флакона. Расположить флакон в ладони таким образом, чтобы дозирующее отверстие на донышке не упиралось в ладонь. Затем надавить на верх флакона, в результате чего одна таблетка выпадет из дозирующего отверстия на донышке.;

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ препарата; тяжелая печеночная или почечная недостаточность; тяжелая сердечная недостаточность (синдром низкого сердечного выброса); детский возраст до 6 лет; период кормления грудью (клинические исследования отсутствуют); редкая наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы и синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы (из-за присутствия в составе препарата лактозы).;С осторожностью: артериальная гипотензия; пациенты детского возраста (недостаточность клинического опыта применения); беременность ;

Применение при беременности и кормлении грудью

В проведенных исследованиях не выявлено тератогенное и эмбриотоксическое действие дротаверина, а также неблагоприятное воздействие на течение беременности. Однако при необходимости применения препарата Но-шпа во время беременности, следует соблюдать осторожность, и назначать препарат только после оценки соотношения потенциальной пользы для матери и возможного риска для плода.;В связи с отсутствием необходимых клинических данных в период грудного вскармливания назначать не рекомендуется;

Побочные действия

Ниже представлены неблагоприятные реакции, наблюдавшиеся в клинических исследованиях, разделенные по системам органов с указанием частоты их возникновения в соответствии со следующей градацией: очень часто (⩾10%), часто (⩾1, <10%); нечасто (⩾0,1, <1%); редко (⩾0,01, <0,1%); очень редко, включая отдельные сообщения (<0,01%); неизвестная частота (по имеющимся данным частоту определить нельзя).;Со стороны ССС: редко — ощущение сердцебиения, снижение АД.;Со стороны ЦНС: редко — головная боль, головокружение, бессонница.; Со стороны ЖКТ: редко — тошнота, запор.;Со стороны иммунной системы: редко — аллергические реакции (ангионевротический отек, крапивница, сыпь, зуд) ;

Передозировка

Симптомы: нарушения сердечного ритма и проводимости, включая полную блокаду ножек пучка Гиса и остановку сердца, которая может быть фатальной.;Лечение: в случае передозировки пациенты должны находиться под медицинским наблюдением, и при необходимости, им должно проводиться симптоматическое и направленное на поддержание основных функций организма лечение;

Взаимодействие с другими препаратами

Леводопа. Ингибиторы ФДЭ, подобные папаверину, снижают антипаркинсоническое действие леводопы. При назначении дротаверина одновременно с леводопой возможно усиление ригидности и тремора.;Другие спазмолитические средства, включая м-холиноблокаторы. Взаимное усиление спазмолитического действия;

Особые указания

С осторожностью применяют у пациентов с выраженным атеросклерозом коронарных артерий, при артериальной гтипотензии.;Дротаверин может быть использован в составе комбинированной терапии для купирования гипертонического криза;