Инструкция по применению
Но-шпа 40 мг 48 шт таблетки

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Венгрия
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Дротаверин
Количество в упаковке: 48
Дозировка действующего вещества: 40 мг
Срок годности: 36



Описание

Но-шпа® — препарат при спазме и боли* в животе. Но-шпа® — таблетки при болях* в животе у взрослых и детей от 6 лет, которые помогают уменьшать болевые ощущения при спазме гладкой мускулатуры. Преимущества и особенности средства от спазма и боли в животе Но-шпа®:Применяется у взрослых и детей старше 6 лет для лечения спазмов гладкой мускулатуры при заболеваниях желчевыводящих и мочевыводящих путей(1).Используется в качестве вспомогательной терапии при спазмах гладкой мускулатуры ЖКТ, а также при менструальных болях (1).Действует избирательно при боли в животе, не маскируя симптомы «острого живота» (2) Обладает высоким профилем безопасности (3).Обладает большой доказательной базой: более 50 клинических исследований с участием 13 500 пациентов. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. *Боль, вызванная спазмом гладкой мускулатуры1. Листок-вкладыш (информация для пациента) лекарственного препарата Но-шпа®,(РУ ЛП-№(002774)-(РГ-RU)). - показания; противопоказания и т.д. см. в государственном реестре лекарственных средств.2. Наиболее часто абдоминальные боли являются следствием спазма гладкомышечных элементов полых органов. Ивашкин В.Т. и др. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. Руководство для практикующих врачей – М.:Литтерра, 2003 – 1046.3. Tar A. et al. Safety profile of No-Spa Orv. Hetil 2002;11:559-562.

Действующее вещество

Дротаверин

Состав

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения. Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача. Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз. Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша. Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу. Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 40 мг дротаверина (в виде гидрохлорида). Прочими вспомогательными веществами являются: магния стеарат, тальк, повидон К-25, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат, опадрай II 85G32431 желтый.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Но-шпа применяется у взрослых и детей старше 6 лет для лечения: В качестве вспомогательного лечения препарат Но-шпа применяется: Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза: По 1 - 2 таблетки 2-3 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 6 таблеток (что соответствует 240 мг). Если в течение нескольких часов после приема максимальной разовой дозы наблюдается умеренное уменьшение боли, или отсутствие уменьшения боли, или если боль существенно не уменьшается после приема максимальной суточной дозы, пожалуйста, обратитесь к врачу. Применение у детей и подростков: Клинические исследования по применению дротаверина у детей не проводились. В случае необходимости приема детьми рекомендуемая доза: Максимальная суточная доза - 2 таблетки (что соответствует 80 мг). Путь и (или) способ введения Для приема внутрь. Таблетку следует проглатывать, запивая достаточным количеством жидкости. Продолжительность лечения Без консультации с врачом препарат Но-шпа можно использовать только для кратковременного применения. При приеме препарата без консультации с врачом рекомендованная продолжительность приема препарата Но-шпа обычно составляет 1-2 дня. В случаях, когда препарат Но-шпа применяется для вспомогательного лечения, его продолжительность без консультации с врачом может быть 2-3 дня. Проконсультируйтесь с лечащим врачом в случае ухудшения симптомов или при сохранении боли.

Противопоказания

Не принимайте препарат Но-шпа если: Не давайте препарат детям младше 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. В исследованиях не было выявлено вредного воздействия на мать или плод при применении препарата во время беременности. Однако, применение препарата Но-шпа во время беременности требует соблюдения осторожности и должно проводиться только по назначению врача. Не рекомендуется применять препарат Но-шпа, если Вы кормите грудью.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Но-шпа может вызывать нежелательные реакции, однако, они возникают не у всех. Прекратите прием препарата Но-шпа и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения следующих признаков аллергической реакции, которая наблюдалась редко (может возникать не более чем у 1 человека из 1 000):Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Но-шпа: Редко (могут возникать у более чем 1 из 10 000 человек, но менее чем 1 из 1000) Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

Передозировка

Если Вы приняли препарата Но-шпа больше, чем следовало Если Вы приняли препарата Но-шпа больше, чем следовало, обязательно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу, так как передозировка препаратом может вызвать проблемы с работой сердца (нарушения сердечного ритма и проводимости), которые могут привести к смертельному исходу. Если Вы забыли принять препарат Но-шпа Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. В частности, сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете:

Особые указания

Препарат Но-шпа содержит лактозы моногидрат. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу перед приемом препарата. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: При приеме внутрь в рекомендованных дозах препарат Но-шпа не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. При проявлении каких-либо нежелательных реакций проконсультируйтесь с врачом, чтобы решить вопрос о возможности управлять транспортными средствами и работать с механизмами. В случае появления головокружения после приема препарата следует избегать управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для детей месте. Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на блистере и картонной пачке. Датой истечения срока годности является последний день месяца. Для таблеток в блистерах ПВХ/ПВДХ/Алюминий: храните препарат при температуре не выше 30 °C. Для таблеток в блистерах Алюминий/Алюминий (ламинированные полимером): храните препарат в блистерах при температуре не выше 25 °C.