Инструкция по применению
Нованефрон таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Италия
Производитель: Новатор Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 24.0



Состав

Ортосифон тычиночный (orthosiphon stamineus benth) 80 мг; толокнянка обыкновенная (bearberry) 80 мг; клюква (cranberry juice) 80 мг; кукурузные рыльца (com silk) 80 мг; хвощ (equiseum) 40 мг; черника обыкновенная (dandelion) 40 мг; одуванчик лекарственный (bilberry common) 40 мг; цитрат магния 20 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

-Острые и хронические воспалительные заболевания мочеполовых органов (уретрит, цистит, пиелонефрит, вульвит, вагинит); -почечные камни (нефролитиаз) и камни мочевого пузыря; -хронический вирусный гепатит; -нефротический синдром; -артериальная гипертензия; -при сердечно-сосудистой недостаточности II-III степени (совместно с сердечными гликозидами); -холецистит, цирроз печени, асцит, глистные инвазии.

Способ применения и дозы

При свободном применении потребителем, надо соблюдать нормы, которые указаны на упаковке. Если препарат назначается врачом, возможно изменение в дозировках. По 1-2 таблетке два раза в день утром и вечером. Длительность лечения 2-8 недель.

Противопоказания

-Повышенная чувствительность к компонентам препарата; -гиперацидный гастрит; -язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки на фоне повышенной кислотности желудочного сока; -повышенная свертываемость крови.

Применение при беременности и кормлении грудью

Так как биологически активные добавки к пище имеют свободное применение потребителями, Нованефрон не советуют применять беременным без рекомендации врача. Врач, определив нужду арбутинина и гидрохонина у беременной может назначить Нованефрон. Применение Нованефрона при беременности возможно только во II и III триместре.

Побочные действия

Нованефрон обычно переносится хорошо. Редко: аллергические реакции, слабость.

Условия хранения

В сухом месте