Инструкция по применению
Ретиноевая мазь для наружного применения 0,1% 15 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Ретиноиды
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Изотретиноин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,1%
Срок годности: 24

Описание

Однородная мазь от светло-желтого до желтого цвета.

Действующее вещество

Изотретиноин

Состав

Активное вещество: изотретиноин 0,05 г.Вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол - 0,05 г, бутилгидроксианизол - 0,025 г, воск эмульсионный - 8,0 г, вазелиновое масло - 8,0 г, глицерол (глицерин) - 10,0 г, этанол (спирт этиловый) 95 % -10,0 г, вода очищенная до 100 г.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Угри обыкновенные, себорейный дерматит, розацеа, периоральный дерматит.

Способ применения и дозы

Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза в день. Продолжительность лечения - 4-12 недель. Повторный курс лечения возможен после консультации с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется наносить на обширные участки кожи при беременности, кормлении грудью и женщинам, планирующим беременность.

Побочные действия

На второй неделе лечения возможна реакция обострения - появление новых высыпаний, зуда, покраснения и шелушения кожи. При резко выраженной реакции рекомендуется прекратить лечение на несколько дней до ее стихания. В отдельных случаях при индивидуальной чувствительности в первый - второй день применения появляются пятнисто-папулезные высыпания, зуд и отечность. В таких случаях следует отменить препарат. При длительном применении возможно развитие симптомов хронического гипервитаминоза А (хейлит, конъюнктивит, сухость и шелушение кожи).

Передозировка

Мазь не следует назначать больным, получающим другие препараты из группы ретиноидов, чтобы уменьшить риск возникновения гипервитаминоза А. Действие мази ослабляется при одновременном местном применении глюкокортикостероидов.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется наносить мазь на кожу вокруг глаз, а также при выраженном остром воспалении. Нельзя наносить на слизистые оболочки. Во время лечения следует избегать пребывания на солнце, при необходимости прибегать к применению солнцезащитных средств, не рекомендуется профилактическое и лечебное применение ультрафиолетовых лучей и посещение солярия.Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и выполнять работы, требующие повышенной концентрации внимания.

Условия хранения

Не допускать замерзания