Инструкция по применению
Нурофен Экспресс Капсулы 200 мг 40 шт



Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Великобритания
Производитель: Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ибупрофен
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 200 мг

Описание

Овальные капсулы с красной полупрозрачной желатиновой оболочкой, с идентифицирующей надписью белого цвета NUROFEN, содержащие прозрачную жидкость от бесцветного до светло-розового цвета.

Действующее вещество

Ибупрофен

Состав

Одна капсула содержит действующее вещество – ибупрофен 200,00 мг, Вспомогательные вещества: макрогол-600 218,33 мг, калия гидроксид 25,60 мг, Твода 17,07 мг; оболочка капсулы: желатин 119,80 мг, сорбитол частично дегидрированный 58,19 мг, краситель пунцовый \[Понсо 4R\] (E124) 0,485 мг, вода 15,02 мг, чернила белые \[Опакод WB NS-78-18011\] (вода 48,0 %, титана диоксид (E171) 29,0 %, пропиленгликоль 10,0 %, изопропанол 8,0 %, гипромеллоза 5,0 %).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Препарат Нурофен® Экспресс Форте применяется у взрослых и подростков в возрасте от 12 лет с массой тела от 40 кг для симптоматического лечения при следующих состояниях: Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент применения, на прогрессирование заболевания не влияет.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза В отсутствие иных указаний лечащего врача рекомендуются следующие дозы: Взрослые и подростки старше 12 лет: начальная доза: 1 капсула (400 мг ибупрофена). Далее при необходимости принять еще 1 капсулу (400 мг ибупрофена) через 6-8 часов. Не принимайте более трех капсул (1200 мг) в течение 24 часов. Дети: препарат противопоказан детям до 12 лет или с массой тела менее 40 кг. Путь и (или) способ введения Внутрь. Капсулу не следует разжевывать. Капсулу следует запивать водой. Интервал между приемами препарата должен составлять не менее 6 часов. Пациентам с заболеваниями ЖКТ рекомендуется принимать препарат Нурофен® Экспресс Форте во время приема пищи. При применении после приема пищи действие препарата может замедлиться. В таком случае не следует принимать большую дозу препарата, чем рекомендовано. Необходимо соблюдать требуемый интервал между двумя дозами. Продолжительность терапии Только для кратковременного применения. Принимайте препарат максимально коротким курсом в минимальной эффективной дозе, достаточной для устранения симптомов. Подростки Рекомендуется обратиться к врачу при необходимости применения препарата у подростков старше 12 лет дольше 3 дней или при ухудшении состояния. Взрослые Рекомендуется обратиться к врачу при необходимости применения препарата у взрослых пациентов для лечения лихорадочных состояний дольше 3 дней, для лечения боли дольше 4 дней или при ухудшении состояния. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат Нурофен® Экспресс Форте если у Вас:

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Не применяйте препарат при беременности в сроке более 20 недель. При беременности в сроке менее 20 недель не следует применять данный препарат без назначения лечащего врача. Грудное вскармливание Имеются данные о том, что ибупрофен и его метаболиты в незначительных количествах могут проникать в грудное молоко без каких-либо отрицательных последствий для здоровья грудного ребенка. Ибупрофен можно применять в период кормления грудью при условии применения в рекомендованных дозах и максимально коротким курсом. При необходимости длительного применения препарата обратитесь к врачу для решения вопроса о прекращении грудного вскармливания на период применения препарата. Фертильность у женщин Препарат Нурофен® Экспресс Форте относится к классу НПВП, которые могут снижать фертильность у женщин. Это явление обратимо после прекращения лечения.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Нурофен® Экспресс Форте может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Риск возникновения нежелательных реакций можно свести к минимуму, если принимать препарат коротким курсом в минимальной эффективной дозе, необходимой для устранения симптомов. Нижеперечисленные нежелательные реакции отмечались при кратковременном приеме ибупрофена в дозах, не превышающих 1200 мг/сутки (3 капсулы). Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции или Вас что-то беспокоит, следует прекратить применение препарата и как можно скорее проконсультироваться с лечащим врачом. У пожилых пациентов, принимающих данный препарат, риск развития нежелательных реакций повышен. Серьезные нежелательные реакции Применение препарата необходимо немедленно прекратить и сразу обратиться за медицинской помощью при наличии следующих состояний: Другие нежелательные реакции Сообщите своему врачу, если у Вас появятся любые из перечисленных ниже нежелательных реакций. Часто (не более чем у 1 пациента из 10): Нечасто (не более чем у 1 пациента из 100): Редко (не более чем у 1 пациента из 1 000): Очень редко (не более чем у 1 пациента из 10 000): Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): С применением лекарственных препаратов класса, к которому относится Нурофен® Экспресс Форте, может быть связан несколько повышенный риск развития инфаркта миокарда или инсульта. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленных на территории государств - членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Нурофен® Экспресс Форте больше, чем следовало Если Вы приняли препарат Нурофен® Экспресс Форте больше рекомендуемой дозы или при приеме препарата по ошибке ребенком, немедленно обратитесь к лечащему врачу или в скорую помощь, предоставив медицинским работникам упаковку препарата и данный листок-вкладыш. Симптомы: тошнота, рвота (возможно с кровью), кровь в стуле (в результате желудочно-кишечного кровотечения), шум в ушах, головная боль, боль в желудке, диарея и нистагм. При значительном превышении дозы сообщалось о слабости и головокружении, сонливости, снижении концентрации, потере ориентации, затуманивании сознания, ознобе, боли в груди, ощущении сердцебиения, судорожных обмороках (судорогах, особенно у детей), крови в моче и угнетении дыхания. Лечение: симптоматическое, с обязательным обеспечением проходимости дыхательных путей, мониторингом ЭКГ и основных показателей жизнедеятельности вплоть до нормализации состояния. Рекомендуется пероральное применение активированного угля или промывание желудка в течение одного часа после приема потенциально токсической дозы ибупрофена. Если ибупрофен уже абсорбировался, может быть назначено щелочное питье с целью выведения кислого производного ибупрофена почками, форсированный диурез. Частые или продолжительные судороги следует купировать внутривенным введением диазепама или лоразепама. При усугублении бронхиальной астмы рекомендуется применение бронходилататоров.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении препарата Нурофен® Экспресс Форте и некоторых других лекарственных препаратов возможно их взаимодействие. Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты. Следует избегать одновременного применения ибупрофена со следующими лекарственными средствами: Обязательно проконсультируйтесь у врача, если Вы принимаете: Препарат Нурофен® Экспресс Форте с пищей и напитками Следует избегать употребления алкоголя во время применения препарата Нурофен® Экспресс Форте, так как при одновременном применении препарата и употреблении алкоголя повышается риск развития некоторых нежелательных реакций со стороны ЖКТ и центральной нервной системы.

Условия хранения

Храните препарат при температуре не выше 25 °C. Храните в оригинальной упаковке для защиты от повышенной влажности. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.