Инструкция по применению
Nutilis Clear Смесь сухая для детей с 3 лет и взрослых страдающих дисфагией 175 г

Характеристики

Форма выпуска: Смесь
Страна: Нидерланды
Производитель: Нутриция
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания для детей старше 3 лет и взрослых, страдающих дисфагией (затруднением глотания) - сухая смесь «Нутилис Клиар». Предназначен для загущения еды и напитков у пациентов с орофарингеальной дисфагией различного генеза. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕНОСТИ: Загуститель на основе ксантановой и гуаровой камеди Быстро загущает жидкости и пищу, сохраняя их первоначальный внешний вид, цвет, прозрачность, вкус, запах и питательные свойства Подходит для пациентов с дисфагией различной степени тяжести Устойчив к амилазе слюны, что обеспечивает сохранение текстуры загущенной пищи в ротовой полости и более безопасное глотание1 Снижает риск аспирации и делает акт глотания более безопасным2 Простые условия дозирования и смешивания (в соответствии с IDDSI), можно добавлять до или после жидкости Не содержит глютен и лактозу

Состав

Пищевая ценность на 100 г сухой смеси - на 100 мл готового продукта (при рекомендуемом разведении (14,2 % масса/объем) ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Энергетическая ценность 1217 кДж/290 ккал Жиры 0 г. из которых насыщенные 0 г Углеводы 57,6 г из которых сахара 3,7 г. Пищевые волокна 28,0 г Белки 0,8 г Соль 3,8 г МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА Фосфор 50.0 мг Магний 20,0 мг

Форма выпуска

Смесь

Показания

Прогрессирующие неврологические расстройства, цереброваскулярные заболевания (инсульт), дегенеративные заболевания центральной нервной системы: болезнь моторных нейронов (БАС), болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера; Расстройства нервно-мышечного механизма, например, миопатии, мышечные дистрофии Механические и структурные изменения головы, шеи и пищевода, вызванные опухолями, некрозом, травмой или хирургическим вмешательством Детский церебральный паралич.

Способ применения и дозы

Использовать только мерную ложку, размещенную в упаковке Для загущения пюреобразной пищи добавить сухую смесь до достижения необходимой консистенции, вымыть руки, использовать чистую посуду, убедиться, что верхняя часть упаковки чистая Насыпать необходимое количество сухой смеси в стакан или чашу, медленно вливать жидкость или напиток при постоянном помешивании, перемешать до полного растворения сухой смеси Готовить пищу в расчете на одну порцию и использовать в течение 2 часов Всегда выбрасывать остатки пищи Только для энтерального питания. Не использовать парентерально Принимать под наблюдением врача Не может являться единственным источником питания Количество мерных ложек, необходимое для загущения жидкостей* (1 мерная ложка=1,25 г сухой смеси): Стадия 1 Легкое незначительное загущение Стадия 2 Мягкое загущение Стадия 3 Среднее умеренное загущение Стадия 4 Очень сильное загущение Количество мерных ложек на 200 мл 1 2 3 7 *Используемое количество может незначительно изменяться в зависимости от температуры или исходной густоты жидкости и требуемой вязкост

Противопоказания

Возраст с рождения до 3 лет. С осторожностью применять у пациентов, которым назначена диета с ограничением потребления натрия

Условия хранения

До и после вскрытия упаковку хранить плотно закрытой в сухом прохладном месте при температуре 5-25 С (не в холодильнике) Используйте содержимое вскрытой упаковки в течение 2 месяцев. Всегда закрывайте банку крышкой после использования.