Инструкция по применению
Нутрикомп Дринк Диабет Смесь жидкая для энтерального питания со вкусом ванили 200 мл

Характеристики

Форма выпуска: Смесь
Страна: Германия
Производитель: Б.Браун Медикал АГ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Нутрикомп Дринк Диабет - специализированный продукт для энтерального питания с подсластителями, ванильным вкусом. Полноценное сбалансированное питание с пищевыми волокнами. Не содержит генетически модифицированных продуктов. Не содержит глютен, лактозу. Продукт предназначен для энтерального питания при заболеваниях, связанных с недостаточностью питания или невозможностью самостоятельного приема пищи у пациентов с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетам I и 2 типа и ожирением. Противопоказаниями к применению являются выраженная дисфункция желудочно-кишечного тракта в результате кишечной непроходимости, перфорации желудка и кишечника ишемии кишечника индивидуальная непереносимость какого-либо компонента смеси.Нутрикомп Дринк Диабет (Nutricomp Drink Diabetes/ Nutricomp Drink D) - специализированный продукт для энтерального питания с подсластителями, ванильным вкусом.Полноценное сбалансированное питание с пищевыми волокнами.Не содержит генетически модифицированных продуктов.Не содержит глютен, лактозу.Область применения: продукт предназначен для энтерального питания при заболеваниях, связанных с недостаточностью питания или невозможностью самостоятельного приема пищи у пациентов с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетам I и 2 типа и ожирением.Калорическая плотность 1,0 ккал/млВ 100 мл смеси содержится 1,0 хлебной единицыОбщая калорийность на 200 мл составляет 206 ккал, из них доля: Белков 16 %Жиров 32 %Углеводов 52 %Осмолярность (мОсм/л) 220Осмоляльность (мОсм/кг) 265Не содержит глютена, лактозы (0,007 г /100 мл).Не содержит генетически модифицированных продуктов.Среднее содержание макронутриентов в 200 мл (бутылочка)Энергетическая ценность 206 ккал/ 864 кДжБелки, г 8,2Углеводы, из них 24 гсахара, из них 0,9 глактоза 0,014 гкрахмал 23 гЖиры, из них 7,0 гнасыщенные жирные кислоты, из них 1,0 гмононенасыщенные жирные кислоты 4,4 гполиненасыщенные жирные кислоты, из них 1,3 гомега-3-жирные кислоты, из них 0,6 гЭйкозапентаеновая кислота (ЭПК) 0,2 гДокозагексаеновая кислота (ДГК) 0,1 гПищевые волокна, г 4,2Среднее содержание микронутриентовВитамин А (ретинола ацетат) мкг РЭ 180Витамин D (холекальциферол) мкг 2Витамин Е (DL-альфа-токоферола ацетат) мг ТЭ 3Витамин К (филлохинон) мкг 14Витамин В1 (тиамина мононитрат)мг 0,40Витамин В2 (рибофлавин)мг 0,40Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)мг 0,40Витамин В12 (цианокобаламин)мкг 0,60Витамин С (L-аскорбиновая кислота)мг 20Ниацин (никотинамид)мг НЭ 3,6Фолиевая кислота мкг 60Пантотеновая кислота (кальция-D-пантотенат)мг 1,2Биотин мкг 10Холин (холина хлорид)мг 60Бета-Каротин мг 0,20Натрий мг 200Калий мг 300Кальций мг 150Магний мг 40Фосфор мг 130Хлориды мг 200Железо мг 2,4Цинк мг 2,4Медь мкг 300Йод мкг 26Хром мкг 20Фтор мг 0,2Марганец мг 0,4Молибден мкг 20Селен мкг 14

Состав

Вода, крахмал, белки молока, подсолнечное масло, белки сои, резистентный крахмал, рыбий жир, инулин, пищевые волокна сои, декстрин пшеницы, ароматизаторы: «Ваниль», «Тоффи», рапсовое масло, калия цитрат, пектин, калия гидрофосфат, натрия цитрат,клетчатка, натрия хлорид, эмульгатор соевый лецитин (Е 322), кальция цитрат, магния карбонат, эмульгатор: моно - и диглицериды жирных кислот (Е 471), холин (холина хлорид), подсластители: натрия цикламат (Е 952) и натрия сахаринат (Е 954), бета-каротин витамин С (L-аскорбиновая кислота), цинка сульфат, железа (II) сульфат, витамин Е (DL-альфа-токоферола ацетат), ниацин (никотинамид), пантотеновая кислота (кальция-D-пантотенат), меди (II) сульфат, марганца (II) хлорид, витамин В1 (тиамина мононитрат), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), натрия фторид, витамин В2 (рибофлавин), витамин А (ретинола ацетат), хрома (III) хлорид, фолиевая кислота, натрия молибдат калия иодид. натрия селенит, витамин К (филлохинон). биотин, витамин D (холекальциферол), витамин В12 (цианокобаламин).

Форма выпуска

Смесь

Показания

нарушения углеводного обмена, гипергликемиянедостаточность питания, вызванная различными заболеваниями, истощениеподдержание нормальней функции кишечника заболевания ЖКТ сахарный диабет 1 и 2 типа неврология: и нсульт, депрессия ансрексия, рассеянный склероз, инфекции ЦНСтравмы, пред- и послеоперационный периодонкология химио- и лучевая терапиягериатрия и психиатрия

Способ применения и дозы

Количество продукта определяется специалистомВ качестве дополнительного питания к основному рациону взрослым 2-4 бутылки в сутки, в качестве единственного источника питания: взрослым количество продукта определяется врачом в зависимости от потребности пациента (до 10 бутылок в сутки).

Противопоказания

выраженная дисфункция желудочно-кишечного тракта в результате кишечной непроходимости, перфорации желудка и кишечника ишемии кишечникаиндивидуальная непереносимость какого-либо компонента смеси

Особые указания

Использовать под наблюдением медицинского персонала.Беременным и кормящим женщинам применять по назначению врача.Не вводить внутривенно!Перед употреблением взбалтывать.