Инструкция по применению
Облепиховое Масло-ТФФ 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Облепиховое масло
Количество в упаковке: 1



Описание

Маслянистая жидкость оранжево-красного цвета с характерным запахом. Допускается наличие осадка, растворяющегося при нагревании до 40 °С.

Действующее вещество

Облепиховое масло

Состав

Действующее вещество: облепиховое масло концентрат для приготовления лекарственных форм с содержанием каротиноидов в пересчете на #-каротин 300 мг % - 0,6 кг.Вспомогательное вещество: подсолнечника масло - до 1 кг.

Форма выпуска

Масло

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

В комплексной терапии в качестве ранозаживляющего средства при поражениях кожи и слизистых оболочек: в гастроэнтерологии - язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, в гинекологии - кольпит, эндоцервицит, эрозия шейки матки, в оториноларингологии - послеоперационные раны с целью ускорения заживления, в проктологии - наружный геморрой, трещины прямой кишки, в хирургии - для стимуляции репаративных процессов при раневых повреждениях кожи, лучевых поражениях, ожогах.

Способ применения и дозы

Внутрь, местно, наружно.Внутрь: при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки препарат принимают по 1 чайной ложке 2-3 раза в день. Курс лечения 3-4 недели.Местно: при кольпите, эндоцервиците, эрозии шейки матки, наружном геморрое, трещинах прямой кишки применяют в виде тампонов, обильно пропитанных облепиховым маслом. Курс лечения при кольпите - 10-15 процедур, при эндоцервиците, эрозии шейки матки - 8-12 процедур, при наружном геморрое, трещинах прямой кишки - 5-7 процедур.Наружно: при поражениях кожи применяют в виде масляных повязок. На предварительно очищенный от некротических тканей участок кожи наносят облепиховое масло, а затем накладывают ватно-марлевую повязку, которую меняют через день. Лечение проводят до появления грануляций. В оториноларингологии - при тимпанопластике, после обработки раны антибиотиками или гидрокортизоном, тампонами, обильно пропитанными облепиховым маслом, тампонируют раневую поверхность. Курс лечения - 7-10 процедур.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, при применении внутрь: холецистит, холангит, панкреатит, холелитиаз, гепатит, детский возраст до 12 лет, при ректальном введении - диарея, при наружном и местном применении - профузное кровотечение, обильное гнойное отделяемое из раны.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, при приеме препарата внутрь - ощущение горечи во рту, диарея, желчная колика, при местном и наружном применении возможно ощущение жжения.Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Лечение проводится под наблюдением врача.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.Хранить в недоступном для детей месте.