Инструкция по применению
Облепиховое масло Вифтех Масло для приема внутрь, местно и наружно 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Облепиховое масло
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24

Описание

Маслянистая жидкость оранжево-красного цвета с характерным запахом. Допускается наличие незначительного осадка, растворяющегося при нагревании до 40 °С.

Действующее вещество

Облепиховое масло

Состав

Облепихи плодов масло.

Форма выпуска

Масло

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

В комплексной терапии в качестве ранозаживляющего средства при поражениях кожи и слизистых оболочек: _в гастроэнтерологии_ – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; _в гинекологии_ – кольпит, эндоцервицит, эрозия шейки матки; _в оториноларингологии_ – послеоперационные раны с целью ускорения заживления; _в проктологии_ – наружный геморрой, трещины прямой кишки; _в хирургии_ – для стимуляции репаративных процессов при раневых повреждениях кожи, лучевых поражениях, ожогах.

Способ применения и дозы

Внутрь, местно, наружно. _Внутрь:_ при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки препарат принимают по 1 чайной ложке 2-3 раза в день. Курс лечения 3-4 недели. _Местно:_ при кольпите, эндоцервиците, эрозии шейки матки, наружном геморрое, трещинах прямой кишки применяют в виде тампонов, обильно пропитанных облепиховым маслом. Курс лечения при кольпите – 10-15 процедур, при эндоцервиците, эрозии шейки матки – 8-12 процедур, при наружном геморрое, трещинах прямой кишки – 5-7 процедур. _Наружно:_ при поражениях кожи применяют в виде масляных повязок. На предварительно очищенный от некротических тканей участок кожи наносят облепиховое масло, а затем накладывают ватно-марлевую повязку, которую меняют через день. Лечение проводят до появления грануляций. _В оториноларингологии_ – при тимпанопластике, после обработки раны антибиотиками или гидрокортизоном, тампонами, обильно пропитанными облепиховым маслом, тампонируют раневую поверхность. Курс лечения – 7-10 процедур.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату; при применении внутрь: холецистит, холангит, панкреатит, холелитиаз, гепатит; при ректальном введении – диарея; при наружном и местном применении – профузное кровотечение, обильное гнойное отделяемое из раны; детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции; при приеме препарата внутрь – ощущение горечи во рту, диарея, желчная колика; при местном и наружном применении возможно ощущение жжения. _Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу**._

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Лечение проводится под наблюдением врача. Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 8 до 15°С. Хранить в недоступном для детей месте.