Инструкция по применению
Облепиховое Масло-ТФФ 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Облепиховое масло
Количество в упаковке: 1

Действующее вещество

Облепиховое масло

Состав

Активный компонент: Облепихового масла концентрат − 60 мг(с содержанием суммы каротиноидов,в пересчете на β-каротин, 300 мг%). Вспомогательное вещество:Подсолнечника масло − до 100 мг.

Форма выпуска

Масло

Показания

В комплексной терапии в качестве ранозаживляющего средства при поражениях кожи и слизистых оболочек: в гастроэнтерологии – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; в гинекологии – кольпит, эндоцервицит, эрозия шейки матки; в оториноларингологии – послеоперационные раны с целью ускорения заживления; в проктологии – наружный геморрой, трещины прямой кишки; в хирургии – для стимуляции репаративных процессов при раневых повреждениях кожи, лучевых поражениях, ожогах.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, внутрь. Наружно: при поражениях кожи в виде масляных повязок. На предварительно очищенный от некротических тканей участок кожи наносят облепиховое масло, а затем ватно-марлевую повязку, которую меняют через день. Лечение проводят до появления грануляций. Местно: при кольпитах, эндоцервицитах, эрозии шейки матки, геморрое, трещинах прямой кишки применяют в виде тампонов, обильно пропитанных облепиховым маслом. Курс лечения при кольпитах 10-15 процедур; эндоцервицитах, эрозии шейки матки 8-12 процедур; при наружном геморрое, трещинах прямой кишки 5-7 процедур. В оториноларингологии – при тимпанопластике, после обработки раны антибиотиками, тампонами, обильно пропитанными облепиховым маслом, тампонируют раневую поверхность. Курс лечения – 7-10 процедур. Внутрь: при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки принимают по 1 чайной ложке 2-3 раза в день в течение 3-4 недель.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату; при наружном и местном применении – профузное кровотечение, обильное гнойное отделяемое из раны; при применении внутрь – холецистит, холангит, панкреатит, холелитиаз, гепатит; при ректальном введении – диарея; детский возраст до 12 лет.

Особые указания

Перед началом курса лечебно-профилактического употребления облепихового масла необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °C. Хранить в недоступном для детей месте.