Инструкция по применению
Облепиховое Масло для приема внутрь, местного и наружного применения 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Облепиховое масло
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 18



Описание

Маслянистая жидкость оранжево-красного цвета с характерным запахом. Допускается незначительный осадок, растворяющийся при нагревании до 40С.

Действующее вещество

Облепиховое масло

Состав

Активный компонент: Облепихового масла концентрат – 60 мг (с содержанием суммы каротиноидов, в пересчете на #-каротин, 300 мг%) Вспомогательное вещество: Подсолнечника масло – до 100 м

Форма выпуска

Масло

Показания

В комплексной терапии в качестве ранозаживляющего средства при поражениях кожи и слизистых оболочек: в гастроэнтерологии – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; в гинекологии – кольпит, эндоцервицит, эрозия шейки матки; в оториноларингологии – послеоперационные раны с целью ускорения заживления; в проктологии – наружный геморрой, трещины прямой кишки; в хирургии – для стимуляции репаративных процессов при раневых повреждениях кожи, лучевых поражениях, ожогах.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, внутрь. Наружно: при поражениях кожи в виде масляных повязок. На предварительно очищенный от некротических тканей участок кожи наносят облепиховое масло, а затем ватно-марлевую повязку, которую меняют через день. Лечение проводят до появления грануляций. Местно: при кольпитах, эндоцервицитах, эрозии шейки матки, геморрое, трещинах прямой кишки применяют в виде тампонов, обильно пропитанных облепиховым маслом. Курс лечения при кольпитах 10-15 процедур; эндоцервицитах, эрозии шейки матки 8-12 процедур; при наружном геморрое, трещинах прямой кишки 5-7 процедур. В оториноларингологии – при тимпанопластике, после обработки раны антибиотиками, тампонами, обильно пропитанными облепиховым маслом, тампонируют раневую поверхность. Курс лечения – 7-10 процедур. Внутрь: при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки принимают по 1 чайной ложке 2-3 раза в день в течение 3-4 недель.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату; при наружном и местном применении – профузное кровотечение, обильное гнойное отделяемое из раны; при применении внутрь – холецистит, холангит, панкреатит, холелитиаз, гепатит; при ректальном введении – диарея; детский возраст до 12 лет

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции; жжение (при наружном и местном применении), при приеме внутрь: горечь во рту, диарея, желчная колика. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Нет данных о случаях передозировки препарата

Взаимодействие с другими препаратами

Нет данных о взаимодействии с другими препаратами

Особые указания

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.