Инструкция по применению
Одехол табл. 200мг №50

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ПИК-Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гимекромон
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 200 мг
Срок годности: 24



Описание

Одехол — препарат, содержащий гимекромон, который увеличивает образование желчи и ускоряет ее выделение, уменьшает застой желчи в желчном пузыре и предупреждает образование камней. Применяется при дискинезии желчевыводящих путей, хроническом бескаменном холецистите, холангите, после операций на желчных путях, а также при снижении аппетита, тошноте и запорах на фоне застоя желчи.

Действующее вещество

Гимекромон

Состав

Действующее вещество: гимекромон 200 мг. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, желатин, натрия лаурилсульфат, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Показания: Дискинезия желчевыводящих путей и сфинктера Одди по гиперкинетическому типу; Бескаменный хронический холецистит; Холангит; Дисфункция желчных протоков (без камней); Состояние после операций на желчном пузыре и желчных путях; Снижение аппетита, тошнота, запоры, рвота на фоне застоя желчи.

Способ применения и дозы

Рекомендуемая доза: Внутрь, за 30 минут до еды. Взрослые и дети от 7 лет: 200–400 мг (1–2 таблетки) 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 1200 мг. Дети 7–18 лет: 200 мг (1 таблетка) 1–3 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 600 мг. Курс лечения — 2 недели.

Противопоказания

Аллергия на гимекромон или другие компоненты препарата;Непроходимость желчевыводящих путей;Почечная или печеночная недостаточность;Язвенный колит; Болезнь Крона;Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;Гемофилия.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных о применении гимекромона у беременных недостаточно, поэтому рекомендуется избегать применения во время беременности. При необходимости применения в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Возможные нежелательные реакции (частота неизвестна): Головная боль; Диарея; Метеоризм; Боль в животе; Изъязвление слизистой оболочки ЖКТ. Также возможны аллергические реакции (слезотечение, покраснение глаз, насморк, сыпь, отек и др.) — при их появлении прекратить прием и обратиться к врачу.

Передозировка

Случаев передозировки не зарегистрировано. При приеме дозы выше назначенной обратитесь за медицинской помощью.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием с: морфином (ослабляет действие гимекромона); метоклопрамидом (ослабляет действие друг друга); непрямыми антикоагулянтами (гимекромон усиливает их действие).

Особые указания

Препарат не ухудшает выделительную функцию пищеварительных желез и процессы всасывания. При появлении жалоб со стороны печени и/или почек необходимо прекратить прием и обратиться к врачу.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.