Инструкция по применению
Одехол таблетки 400 мг № 50

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ПИК-Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гимекромон
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 400 мг
Срок годности: 24



Описание

Одехол — препарат, содержащий действующее вещество гимекромон, которое увеличивает образование желчи и ускоряет ее выделение, уменьшает застой желчи в желчном пузыре и предупреждает образование камней.Применяется при дискинезии желчевыводящих путей, хроническом бескаменном холецистите, холангите, после операций на желчных путях, а также при снижении аппетита, тошноте и запорах на фоне застоя желчи.

Действующее вещество

Гимекромон

Состав

Действующее вещество: гимекромон 400 мг.Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, желатин, натрия лаурилсульфат, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Дискинезия желчевыводящих путей и сфинктера Одди по гиперкинетическому типу; Бескаменный хронический холецистит;Холангит;Дисфункция желчных протоков (без камней);Состояние после операций на желчном пузыре и желчных путях;Снижение аппетита, тошнота, запоры, рвота на фоне застоя желчи.

Способ применения и дозы

Рекомендуемая доза: 400 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 1200 мг.Способ применения: внутрь, за 30 минут до еды.Продолжительность курса: 2 недели.Дети и подростки: препарат в дозировке 400 мг не следует применять у детей до 18 лет в связи с невозможностью обеспечить режим дозирования.

Противопоказания

Аллергия на гимекромон или другие компоненты препарата;Непроходимость желчевыводящих путей;Почечная или печеночная недостаточность;Язвенный колит; Болезнь Крона;Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;Гемофилия.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных о применении гимекромона у беременных недостаточно. В качестве меры предосторожности рекомендуется избегать применения препарата во время беременности.При необходимости применения в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Возможные нежелательные реакции:Подобно всем лекарственным препаратам, Одехол может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Прекратите прием и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения признаков аллергической реакции:слезотечение, покраснение глаз, насморк без признаков простуды;першение в горле, кашель, затрудненное дыхание; сыпь, тошнота, рвота, отечность губ и других участков тела;диарея, головная боль. Другие возможные реакции (частота неизвестна):головная боль;диарея;вздутие живота;боль в животе;изъязвление слизистой оболочки ЖКТ.

Передозировка

Случаев передозировки не зарегистрировано. При приеме дозы выше назначенной обратитесь за медицинской помощью.

Взаимодействие с другими препаратами

Не принимайте препарат Одехол одновременно с:морфином (морфин ослабляет действие гимекромона);метоклопрамидом (препараты ослабляют действие друг друга); непрямыми антикоагулянтами (гимекромон усиливает их действие).

Особые указания

Перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.Препарат не ухудшает выделительную функцию пищеварительных желез и процессы кишечного всасывания.Если у Вас появились жалобы со стороны печени и /или почек, прекратите прием препарата и обратитесь к лечащему врачу.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.