
Инструкция по применению
Одекромон Таблетки 200 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Интерфарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гимекромон
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 200 мг



Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки от почти белого до белого цвета с фаской по краям с двух сторон и риской с одной стороны.

Действующее вещество

Гимекромон

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Дискинезия желчевыводящих путей и сфинктера Одди по гиперкинетическому типу, некалькулезный хронический холецистит, холангит, желчекаменная болезнь, состояние после оперативных вмешательств на желчном пузыре и желчных путях. Снижение аппетита, тошнота, запоры, рвота (на фоне гипосекреции желчи).

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30 минут до еды. Взрослым - по 200-400 мг (1-2 таблетки) 3 раза в день. Суточная доза 1200 мг.Детям с 7 лет по 200 мг (1 таблетка) 1-3 раза в день.Суточная доза 600 мг.Курс лечения 2-3 недели.В случае пропуска приема дозы следует принять препарат как можно быстрее или, если приближается время следующего приема, пропущенную дозу не принимать. Не следует принимать двойную дозу сразу.Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, илипоявляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту, входящему в состав, непроходимость желчевыводящих путей, почечная/ печеночная недостаточность, язвенный колит и болезнь Крона, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гемофилия, детский возраст до 7 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Нет данных о безопасности применения гимекромона при беременности и в период грудного вскармливания.Назначение Одекромона® беременным женщинам и в период грудного вскармливания допустимо только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, диарея, метеоризм, абдоминальная боль, изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, головная боль.Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Морфин ослабляет действие гимекромона. При совместном приеме с метоклопрамидомпроисходит ослабление действия обоих препаратов. Усиливает эффекты непрямыхкоагулянтов. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственныепрепараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Одекромон® проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Не ухудшает секреторную функцию пищеварительных желез и процессов кишечной абсорбции.В случае появления симптомов печеночной и/или почечной недостаточности необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.