Инструкция по применению
Одекромон Таблетки 200 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Интерфарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гимекромон
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 200 мг



Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки от почти белого до белого цвета с фаской по краям с двух сторон и риской с одной стороны.

Действующее вещество

Гимекромон

Состав

На 1 таблетку: Гимекромон - 200 мг. _Вспомогательные вещества_: крахмал кукурузный - 45 мг, желатин - 3 мг, натрия лаурилсульфат - 1 мг, магния стеарат - 1 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме внутрь легко всасывается из пищеварительного тракта, слабо связывается с белками плазмы. Cmax в сыворотке крови достигается через 2-3 ч. T1/2 составляет около 1 ч. Гимекромон выводится почками (около 93% в виде глюкуроната, 1.4% - сульфоната, 0.3% - в неизмененном виде).

Показания

* дискинезия желчевыводящих путей и сфинктера Одди по гиперкинетическому типу; * некалькулезный хронический холецистит, холангит, желчнокаменная болезнь; * состояние после оперативных вмешательств на желчном пузыре и желчных путях; * снижение аппетита, тошнота, запоры, рвота (на фоне гипосекреции желчи).

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30 минут до еды. **Взрослым** - по 200-400 мг (1-2 таблетки) 3 раза/сут. Суточная доза - 1200 мг. **Детям с 7 лет** по 200 мг (1 таблетка) 1-3 раза/сут. Суточная доза - 600 мг. Курс лечения 2-3 недели. В случае пропуска приема дозы следует принять препарат как можно быстрее или, если приближается время следующего приема, пропущенную дозу не принимать. Не следует принимать двойную дозу сразу. Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Следует применять препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

* повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту. входящему в состав препарата; * непроходимость желчевыводящих путей; * почечная/печеночная недостаточность; * язвенный колит и болезнь Крона; * язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; * гемофилия; * детский возраст до 7 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Нет данных о безопасности применения гимекромона при беременности и в период грудного вскармливания. Назначение препарата Одекромон® беременным женщинам и в период грудного вскармливания допустимо только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, диарея, метеоризм, абдоминальная боль, изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, головная боль. Если у пациента отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или пациент заметил любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует сообщить об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Морфин ослабляет действие гимекромона. При совместном приеме с метоклопрамидом происходит ослабление действия обоих препаратов. Усиливает эффекты непрямых коагулянтов. Если пациент применяет вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в т.ч. безрецептурные), перед применением препарата Одекромон® следует проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Не ухудшает секреторную функцию пищеварительных желез и процессов кишечной абсорбции. В случае появления симптомов печеночной и/или почечной недостаточности необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу. _Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами:_ Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.