**Инструкция по применению**
**Одестон таблетки 200 мг 50 шт**

## Характеристики




Форма выпуска: Таблетки
Страна: Польша
Производитель: Польфа
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гимекромон
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 200 мг
Срок годности: 36.0

## Действующее вещество

Гимекромон

## Состав

7-окси-4-метилкумарин (гимекромон) 0,2 г. ;Вспомогательные компоненты: крахмал, желатин, магния стеарат, додецилсульфат натрия.

## Форма выпуска

Таблетки

## Фармакокинетика

Гимекромон – производное кумарина. Под его воздействием усиливается синтез желчи, ускоряется ее эвакуация в просвет кишечника. Ускорение выделения желчи осуществляется за счет селективного снятия спазма со сфинктера Одди и с гладкомышечной мускулатуры желчных протоков. Влияния на перистальтику Одестона не отмечено. На тонус гладкомышечных тканей сосудистых стенок влияния препарата не зафиксировано. Одестон устраняет холестаз, не дает холестерину кристаллизоваться. Объем выделяемой желчи увеличивается, в ней повышается содержание кислот, холестерола. Это увеличивает активность липазы поджелудочной железы и способствует полноценному эмульгированию жиров и их резорбции.

**Показания**

- Дискинезии желчевыводящих путей; - гиперкинезии сфинктера Одди; - некалькулезном холецистите; - хроническом холангите;- состояниях, сопровождающих пациентов после операций на печени, желчном пузыре; - хронических запорах, причиной которых является гипосекреция желчи; - отсутствии аппетита, диспепсии на фоне гипосекреции желчи.

**Способ применения и дозы**

Прием таблеток для обеспечения терапевтического действия должен происходить до еды (за 30 минут.). Стандартное назначение: 3 табл./день. Возможно увеличение суточной дозировки гимекромона до 1,2 г (6 табл./день). Разделение суточной дозы проводят на три приема. Лечебный курс – 14 дней.

**Противопоказания**

Не назначают Одестон при: - печеночной недостаточности; - обструкции желчного пузыря; - почечной недостаточности; - язвенном колите; - язвенных поражениях желудка; - гиперчувствительности на кумарины, вспомогательные компоненты таблеток Одестон; - болезни Крона; - гемофилии; - лактации; - язве двенадцатиперстной кишки.; Не показан Одестон в детском возрасте.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Назначение Одестона беременным возможно в исключительных случаях, когда врач взвесил соотношения польза матери/риск для плода и определил, что без его применения не обойтись. Клинических испытаний на беременных не проводилось.

**Побочные действия**

При применении Одестона возможно появление: - диареи; - крапивницы; - боли в эпигастрии; - анафилаксии; - изъязвлений ЖКТ; - метеоризма; - головных болей.

**Передозировка**

Дозировку превышать нежелательно из-за возможности усиления побочных эффектов. Официально зарегистрированных случаев превышения дозы нет.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Одестон усиливает эффективность антитромбических средств, антагонистов филлохинона. Морфин ослабляет спазмолитический эффект гимекромона, так как обладает сильным спазмирующим действием в отношении сфинктера Одди. При назначении с метоклопрамидом, его производными наблюдается взаимное ослабление эффективности.

**Особые указания**

Не ухудшает секреторную функцию пищеварительных желез и процессов кишечной абсорбции.; Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Условия хранения**

Беречь от детей