Инструкция по применению
Офломелид Мазь для наружного применения 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Синтез
Порядок отпуска: по рецепту
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24



Состав

Офлоксацин 10 мг, диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) 40 мг, лидокаина гидрохлорид (в форме моногидрата) 30 мг.Вспомогательные вещества: макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500, полиэтиленгликоль низкомолекулярный 1500), макрогол 400 (полиэтиленоксид 400, полиэтиленгликоль низкомолекулярный 400), пропиленгликоль, метилпарагидроксибензоат (нипагин или метилпарабен), пропилпарагидроксибензоат (нипазол или пропилпарабен).

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Офломелид; не предоставлены.

Показания

Инфицированные гнойные раны различной локализации и этиологии в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса, в т.ч. сопровождающиеся выраженным болевым синдромом:— инфицированные ожоги II-IV степени;— пролежни;— трофические язвы;— послеоперационные и посттравматические раны и свищи;— раны после вскрытия абсцессов, флегмон, после хирургической обработки абсцедирующих фурункулов, карбункулов, гидраденитов, нагноившихся атером, липом.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно, 1 раз/сут в течение 1-2 недель. Максимальная суточная доза не должна превышать 100 г мази. Продолжительность лечения зависит от динамики очищения ран от гнойного экссудата и сроков купирования воспалительного процесса.После стандартной обработки ран и ожогов мазь наносят непосредственно на раневую поверхность тонким слоем (после этого накладывают стерильную марлевую повязку) или на марлевую повязку с последующей аппликацией на очаг поражения.Тампонами, пропитанными мазью, рыхло заполняют полости гнойных ран после их хирургической обработки, а марлевые турунды с мазью вводят в свищевые ходы.При лечении инфицированных ожогов препарат применяют ежедневно или 2-3 раза в неделю в зависимости от количества гнойного отделяемого.

Противопоказания

— беременность;— период лактации;— детский и подростковый возраст до 18 лет;— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка

Данные по передозировке препарата Офломелид; не предоставлены.

Взаимодействие с другими препаратами

Не выявлено случаев взаимодействия с лекарственными средствами, которые привели бы к уменьшению эффективности и безопасности применяемых препаратов.

Условия хранения

Беречь от детей