Инструкция по применению
Офломикол Раствор для наружного применения 2 % 15 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сертаконазол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2%
Срок годности: 3

Описание

Противогрибковый препарат для наружного применения.

Действующее вещество

Сертаконазол

Состав

Сертаконазола нитрат 2 г. Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 102 г, троламин - 0.1 г.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Терапевтическая концентрация сертаконазола в ороговевшем слое кожи после нанесения на кожу достигается в течение 30 мин и сохраняется более 48 ч. При ежедневном применении в течение 14 дней в возрастающих количествах сертаконазол не обнаруживается в крови и моче. После интравагинального применения высокие концентрации сертаконазола в просвете влагалища сохраняются длительное время и значительно превышают как минимальные ингибирующие концентрации, так и фунгицидные концентрации в отношении C.albicans, C.glabrata и других грибов, не относящихся к роду Candida. Системная абсорбция после интравагинального применения отсутствует. Неизмененный сертаконазол не обнаруживается ни в плазме крови, ни в моче.

Показания

Поверхностные микозы кожи: дерматофитозы, микозы голеней, стоп и кистей, микозы туловища, микоз бороды, кандидоз, разноцветный (отрубевидный) лишай, себорейный дерматит. Инфекции слизистой оболочки влагалища, вызываемые грибами рода Candida (кандидозный вульвовагинит).

Способ применения и дозы

Наружно применяют 1-2 раза в сутки в течение 2-4 недель. Интравагинально - 1 раз в сутки в течение 7 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к сертаконазолу, производным имидазола.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности возможно, если предполагаемая польза терапии для матери превосходит потенциальный риск для плода или грудного ребенка. В период лактации интравагинальное применение возможно, если предполагаемая польза терапии для матери превосходит потенциальный риск для грудного ребенка, при необходимости наружного применения следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

При наружном применении:быстро проходящая местная эритематозная реакция. При интравагинальном применении:редко - ощущение жжения, зуд во влагалище, которые проходят самостоятельно.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременное интравагинальное применение сертаконазола и местных спермицидных контрацептивных препаратов, т.к. возможно ослабление спермицидного эффекта.

Особые указания

Не рекомендуется применять сертаконазол в офтальмологической практике. При отсутствии характерной клинической симптоматики одно только выявление грибов рода Candida на слизистой оболочке влагалища не может являться показанием для применения сертаконазола. При подтверждении диагноза кандидоза рекомендуется выявить и устранить бытовые и гигиенические факторы, способствующие развитию и сохранению инфекции. Рекомендуется применять нейтральное мыло для гигиены половых органов, использовать хлопковое нижнее белье вместо синтетической одежды. Не рекомендуется использование кислотных моющих средств (кислая среда способствует размножению грибов рода Candida). В период лечения рекомендуется воздерживаться от половых контактов. Для предотвращения урогенитальной реинфекции рекомендуется проводить одновременное лечение полового партнера.

Условия хранения

При температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.