Инструкция по применению
Офталамин Классик Таблетки 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Герофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Офталамин Классик. Биорегулятор зренияПри близорукости, заболеваниях сетчатки. «Береги как зеницу ока» - трудно переоценить важность хорошего зрения в нашей жизни. Наши глаза – сложный и чувствительный орган. Наиболее важными составляющими глаза, которые позволяют нам видеть, являются: роговица, радужная оболочка, хрусталик, сетчатка, желтое пятно и зрительный нерв.Различные повреждения и заболевания глаз могут привести к частичной или полной потере зрения.Повреждения глаз могут иметь множество причин: Механические повреждения – вызываются пылью или твердыми телами, такими как стружка и опилки, осколки и зерно, попавшие в глаза. Пыль раздражает глаз и может вызвать воспаление. Твердые тела могут проникать через роговицу и травмировать ее. Оптические травмы – вызваны излучением. Воздействие интенсивного или длительного излучения или быстро меняющаяся интенсивность света могут повредить глаза. Возможны воспаления роговицы и конъюнктивит. Химические повреждения – могут быть вызваны разными типами химических веществ, например, щелочами или кислотами. Капля кислоты может привести к образованию язвы на роговице и оставить постоянные рубцы. А несколько капель щелочи могут повредить всю роговицу навсегда. Термические травмы – вызваны слишком низкими или высокими температурами окружающей среды. Тепло вызывает раздражение роговицы из-за высыхания ее поверхности. Длительное воздействие холода может привести к симптомам обморожения.Повреждения, как и заболевания глаза, приводят к разнообразным осложнениям. Одно из самых опасных это дистрофия сетчатки. Дистрофия сетчатки глаза возникает из-за нарушения сосудистых структур.

Преимущественно болезнь проявляется у пожилых людей. И провоцирует постепенное ухудшение зрения. Поскольку при развитии заболевания страдают клетки-фоторецепторы, нарушаются функции восприятия цвета и дальнего видения. На ранних стадиях изменения не критичны, поэтому могут долго не обращать на себя внимания. Статистика показывает, что дистрофия сетчатки – модна из трех болезней, которые ответственны за снижение зрения и слепоту у пациентов старше 50 лет. Факторы риска развития дистрофии сетчатки: Возраст # повышение риска дистрофии наблюдается в период с 50 до 80 лет. Однако в последние годы заболевание существенно «помолодело», так как все чаще стало проявляться у лиц трудоспособного возраста, Пол # женщины более подвержены дистрофическим изменениям сетчатки глаза, Наследственность, Патологии сердца и сосудов, гипертоническая болезнь, атеросклероз, Переизбыток ультрафиолета # длительное воздействие солнца на незащищенные глаза опасно также, как продолжительное влияние лазера, Курение, Сахарный диабет, Несбалансированное питание с недостатком витаминов и полезных веществ, Предшествующие травмы и операции на глазах.Важно как можно дольше не допускать развития дистрофических изменений в сетчатке. Открытие сделанное в 1999 году Гюнтером Блобелом, показало, что для любой клетки нашего организма важны белки (протеины), которые контролируют процессы межклеточного взаимодействия и определяют способность к самовосстановлению клетки. Недостаток пептидов (с возрастом или при патологии) ускоряет износ тканей, процессы старения и приводит к развитию заболеваний.Как действует Офталамин Классик?Компоненты Офталамин Классик, получаемые из ферментно-эндокринного сырья, представляют собой комплекс белков и нуклеопротеидов, обладающих избирательным действием на клеточные структуры различных отделов глаза, что способствует ускорению восстановления нарушенных функций органа зренияБлагодаря механизму трансцитоза поступающий белок в неизмененном виде оказывается в клетке - цели. В данном случае целью являются клетки различных отделов органа зрения. Попадая в них, Офталамин Классик насыщает клетки оптимальным белковым «рационом», позволяя им быстрее восстанавливаться и нормализовать выполнение своих функций.Клинические испытания Офталамин Классик проводились у 198 больных с офтальмологической патологией, включавшей дистрофические заболевания сетчатки глаза и посттравматическую дистрофию роговицы.В результате проведенных исследований установлено, что при курсовом использовании Офталамин Классик у больных с дистрофическими изменениями сетчатки выявлено повышение остроты и расширение полей зрения. Применение Офталамин Классик при посттравматических нарушениях роговицы способствовало ускоренному восстановлению целостности эпителиального слоя роговицы и повышению остроты зрения.

Состав

Каждая таблетка 0,155 г содержит:офталамин порошок (комплекс полипептидов и нуклеиновых кислот, полученный из тканей глазного яблока свиней), лактоза (наполнитель), сахар-песок (загуститель), крахмал картофельный (разрыхлитель), кальция стеарат (агент антислеживающий), дисперсия сополимера метакриловой кислоты (кишечнорастворимое покрытие), пропиленгликоль (эмульгатор).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Способствует нормализации и улучшению зрения при различных нарушениях, рекомендуется при значительных ежедневных зрительных нагрузках.Офталамин Классик рекомендован к применению при следующих состояниях, таких как: Травмы глаза и их последствия Заболевания роговицы, кератит, кератоконус, дистрофия роговицы Дистрофические изменения сетчатки Пред- и постоперационный периоды при офтальмологических операциях Диабетическая ретинопатия При повышенных зрительных нагрузках (работе за компьютером) Лицам пожилого возраста с целью поддержания функции органа зрения

Способ применения и дозы

Офталамин Классик рекомендуется принимать по 1-3 таблетки за 10–15 минут до еды 2-3 раза в день в течение 30-45 дней. Повторный курс через 3-6 месяцев. Длительность и периодичность курсов могут быть скорректированы по согласованию с лечащим врачом. Офталамин Классик не имеет противопоказаний и может использоваться как самостоятельно, так и в рамках комплексной терапии.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.