Инструкция по применению
Офтальмоферон Капли глазные 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Фирн М
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Интерферон альфа-2b+Дифенгидрамин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10000 МЕ+1 мг /1 мл
Срок годности: 24.0

Описание

Офтальмоферон, глазные капли — это высокоактивный противовирусный и противоаллергический препарат для лечения вирусных конъюнктивитов (включая конъюнктивиты вызываемые вирусами герпеса, аденовирусами). Воспалительные заболевания глаз занимают ведущее место в ряду глазных болезней (до 50% всех обратившихся к офтальмологам). В клинической практике для местной терапии таких заболеваний, как вирусные (аденовирусные и герпетические) конъюнктивиты, кератиты, кератоконъюктивиты, увеиты, с высокой эффективностью использовались препараты человеческого интерферона, полученные из лейкоцитов крови. В настоящее время в практику здравоохранения широко внедряются препараты интерферона генно-инженерного происхождения как наиболее очищенные (степень очистки до 99%), гарантированно безопасные с точки зрения вирусной контаминации и позволяющие применять более высокие концентрации интерферона. Лекарственная форма в виде готовых глазных капель на основе генноинженерного интерферона впервые в мире была разработана ЗАО «ФИРН М» под руководством профессора П. Я. Гапонюка. Препарат, предназначенный для лечения глазных болезней вирусной этиологии, получил название Офтальмоферон.

Действующее вещество

Интерферон альфа-2b+Дифенгидрамин

Состав

В 1 мл капель Офтальмоферон содержится: Интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2 - не менее 10000 МЕ, димедрол - 0,001 г, борная кислота -0,0031 г, поливинилпирролидон - 0,01 г, полиэтиленоксид - 0,05 г, трилон Б - 0,0004 г, гипромеллоза - 0,003 г, натрия хлорид - 0,004 г, натрия ацетат - 0,007 г.

Форма выпуска

Капли

Показания

Лечение аденовирусных (в том числе при аллергическом конъюнктивите, во время весенней лихорадки), эпидемических, геморрагических (энтеровирусных), герпетических конъюнктивитов; Аденовирусных, герпетических (везикулезного, точечного, древовидного, картообразного) кератитов; Герпетического стромального кератита с изъязвлением роговицы и без изъязвления; Аденовирусных и герпетических кератоконъюнктивитов, герпетических увеитов; Герпетических кератоувеитов (с изъязвлениями и без них); Профилактика инфекции глаз в пред- и послеоперационном периоде; Противовоспалительная и симптоматическая терапия вторичного сухого глаза, в комплексной терапии хламидийных конъюнктивитов.

Способ применения и дозы

В острой стадии заболевания Офтальмоферон применяется в виде закапываний в глаза по 1-2 капли до 6-8 раз в день. По мере затихания воспалительного процесса число инстилляций уменьшают до 2-3 раз в день. Курс лечения зависит от вида заболевания и степени его тяжести. Срок годности — 2 года. Офтальмоферон — готовые глазные капли, расфасованные во флаконы-капельницы по 10 мл.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение во время беременности и в период кормления грудью считается обоснованным и безопасным.

Побочные действия

Не отмечено.

Взаимодействие с другими препаратами

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Офтальмоферон не предоставлены.

Особые указания

Офтальмоферон прошел экспериментальные медико-биологические и клинические исследования в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Применение препарата сокращает сроки исчезновения фолликулярной реакции при аденовирусном конъюнкти-вите, приводит к исчезновению отека и гиперемии, способствует быстрому регрессу субэпителиальных инфильтратов при эпидемическом кератоконъюнктивите. При лечении герпетических кератитов препаратом Офтальмоферон полная эпителизация роговицы и резорбция инфильтрации стромы отмечалась в достоверно более ранние сроки по сравнению с применением лейкоцитарного интерферона, полученного из крови человека.

Условия хранения

В сухом месте