Инструкция по применению
Офтан Катахром Капли глазные 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли глазные
Страна: Финляндия
Производитель: Сантэн
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аденозин+Никотинамид+Цитохром С
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 675 мкг+2 мг+20 мг/1 мл
Срок годности: 36

Действующее вещество

Аденозин+Никотинамид+Цитохром С

Состав

На 1 мл: цитохром С 675 мкг, аденозин 2 мг, никотинамид 20 мг. Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия сукцината гексагидрат, сорбитол, натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия гидрофосфата дигидрат, вода д/и.

Форма выпуска

Капли глазные

Фармакокинетика

Всасывание и распределениеПри местном применении цитохром С не всасывается в системный кровоток.Аденозин хорошо проникает через роговицу.Метаболизм и выведениеЦитохром С полностью метаболизируется в организме теми же путями, что и аминокислоты, а гем расщепляется до билирубина, который выводится с желчью. Аденозин метаболизируется практических во всех тканях с образованием инозина, ксантина и урата, которые выводятся с мочой. Рибоза, которая является часть молекулы аденозина, метаболизируется до глицеральдегид-3-фосфата, а затем - до пирувата, и окончательно расщепляется в цикле Кребса. T1/2 аденозина из плазмы составляет менее 1 мин.Никотинамид частично метаболизируется до никотиновой кислоты. Оба соединения метилируются с образованием N-метилникотинамида, который в дальнейшем расщепляется в печени. Неизмененный никотинамид и метаболиты выводятся с мочой.

Показания

Катаракта различного генеза.

Способ применения и дозы

Назначают по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок 3 раза/сут.При первом использовании флакона следует повернуть крышку флакона с одновременным нажатием вниз и затем открыть флакон

Противопоказания

- детский и подростковый возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности применения препарата у детей и подростков),- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не имеется достаточного опыта применения препарата Офтан Катахром при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).Возможно применение препарата Офтан Катахром при беременности и в период лактации по назначению врача и случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка.

Побочные действия

Со стороны органа зрения: кратковременное ощущение жжения и пощипывания глаз, аллергический конъюнктивит, контактный дерматит.Системные реакции: крайне редко - кратковременные тошнота, артериальная гипотензия, головокружение, одышка, ощущение жара и пульсации в висках, обмороки (за счет сосудорасширяющего действия никотиновой кислоты).

Передозировка

Данных о передозировке препарата Офтан Катахром не имеется.

Взаимодействие с другими препаратами

Не выявлено клинически значимого взаимодействия препарата Офтан Катахром с другими лекарственными средствами.

Особые указания

В период лечения препаратом Офтан Катахром не следует носить мягкие контактные линзы, т.к. консервант может отложиться в них и оказать неблагоприятное воздействие на ткани глаза. Перед применением Офтан Катахрома контактные линзы следует снять и установить их вновь через 15 мин после инстилляции препарата. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПациенты, у которых после закапывания препарата появляется кратковременное раздражение глаз, должны избегать вождения автотранспорта, работы с техникой, станками или каким-либо другим оборудованием, требующим хорошей остроты зрения, сразу после применения глазных капель.

Условия хранения

Хранить при температуре от 2 до 8 °С, в недоступном для детей месте. После вскрытия флакона - 1 месяц.