Инструкция по применению
Офтаринт глазные Капли 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Гротекс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аденозин+Никотинамид+Цитохром С
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2 мг+20 мг+0.675 мг/1 мл

Описание

Прозрачный раствор красного цвета.

Действующее вещество

Аденозин+Никотинамид+Цитохром С

Состав

Состав препарата на 1 мл: Действующие вещества: Аденозин 2,0 мг Никотинамид 20,0 мг Цитохром С 0,675 мг Вспомогательные вещества: Сорбитол 10,0 мг Натрия дигидрофосфата дигидрат 4,415 мг Натрия гидрофосфата дигидрат 2,847 мг Натрия сукцината гексагидрат 1,0 мг Бензалкония хлорид 0,04 мг Вода для инъекций до 1 мл

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При местном применении цитохром С не всасывается в системный кровоток, в организме метаболизируется полностью. Распад цитохрома С идет по тем же метаболическим путям, что и расщепление аминокислот, а гем, расщепленный до билирубина, выводится с желчью. Аденозин свободно проходит через роговицу. Период полувыведения аденозина из плазмы составляет меньше одной минуты, он метаболизируется практически во всех тканях с образованием инозина, ксантина и урата, свободно выводящихся с мочой. Рибоза, которая является составным элементом аденозина, метаболизируется до глицеральдегид-3-фосфата, затем до пирувата и сгорает в цикле Кребса. Никотинамид частично метаболизируется до никотиновой кислоты. Оба эти соединения метилируются в N-метилникотинамид, который в дальнейшем распадается в печени. Метаболиты и неизмененный никотинамид экскретируются мочой.

Показания

Катаракта различного генеза.

Способ применения и дозы

Местно, по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок 3 раза в день.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности препарата у детей и подростков до 18 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности и в период грудного вскармливания нет. Возможно применение препарата для лечения при беременности и в период грудного вскармливания, если ожидаемый лечебный эффект для матери оправдывает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Со стороны глаз: кратковременное жжение и пощипывание глаз, аллергический конъюнктивит, контактный дерматит. Системные побочные эффекты наблюдаются крайне редко. Могут наблюдаться кратковременные тошнота, артериальная гипотония, головокружение и одышка. Никотиновая кислота обладает сосудорасширяющим действием и может вызывать ощущение жара, обмороки и ощущение пульсации в висках.

Передозировка

Данные о передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Не выявлено клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Бензалкония хлорид, который часто используется в офтальмологических препаратах в ка-честве консерванта, может вызвать точечную кератопатию и/или токсическую язвенную кератопатию. Поскольку препарат содержит бензалкония хлорид, необходим тщательный мониторинг в случае частого или длительного применения у пациентов с синдромом «сухого» глаза или в случаях повреждения роговицы. Бензалкония хлорид может изме¬нить цвет мягких контактных линз. Необходимо снимать мягкие контактные линзы перед применением препарата и надевать их снова через 15 минут после закапывания. Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами Пациенты, у которых после закапывания препарата появляется кратковременное раздражение глаз, не должны управлять автомобилем, работать с техникой, станками или каким-либо другим оборудованием, требующим хорошей остроты зрения сразу после применения глазных капель.

Срок хранения после открытия

3 года. После вскрытия флакона – 1 месяц. Нс применять после окончания срока годности!

Условия хранения

При температуре от 2 до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.