Инструкция по применению
Офтоципро мазь глазная 0,3% 3 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ципрофлоксацин
Количество в упаковке: 1



Описание

Мазь белого цвета или белого со слегка желтоватым, зеленоватым или сероватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Ципрофлоксацин

Состав

В 100 г мази активного вещества: ципрофлоксацина гидрохлорида в пересчете на ципрофлоксацин 0,3 г. вспомогательные вещества: нипагин (метилпарагидроксибензоат), вазелин медицинский, ланолин безводный.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания глаз, вызванные чувствительными микроорганизмами (острый и подострый конъюнктивит, блефарит, блефароконъюнктивит, кератит, кератоконъюнктивит, бактериальная язва роговицы, хронический дакриоцистит, мейбомит, инфекционные поражения глаз после травм или попадания инородных тел), пред- и послеоперационная профилактика инфекционных осложнений в офтальмохирургии.

Способ применения и дозы

У взрослых и детей старше 2 лет. Полоску мази длиной 1-1,5 см закладывают за нижнее веко пораженного глаза 3 раза в день в течение 2-х суток. Затем в течение 5 дней применяют препарат 2 раза в день. В случае развития тяжелого инфекционного процесса мазь закладывается каждые 3-4 часа, по мере уменьшения явлений воспаления, уменьшают частоту применения препарата. Курс лечения не должен превышать 14 дней. Для введения мази следует осторожно оттянуть нижнее веко вниз и, слегка нажав на тюбик, ввести в конъюнктивальный мешок полоску мази. Затем медленно отпустить веко и прижать его с помощью ватной палочки или ватного тампона в течение 1-2 минут. После этого следует закрыть глаза в течение 1-2 минут.

Противопоказания

Гиперчувствительность, беременность, период лактации, детский возраст (до 2-х лет), вирусные и грибковые поражения глаз.

Побочные действия

Аллергические реакции, зуд, жжение, легкая болезненность и гиперемия конъюнктивы, тошнота, редко - отек век, светобоязнь, слезотечение, ощущение инородного тела в глазах, неприятный привкус во рту сразу после закладывания, снижение остроты зрения, появление белого кристаллического преципитата у больных с язвой роговицы, кератит, кератопатия, инфильтрация роговицы, развитие суперинфекции.

Передозировка

Данные по передозировке препарата отсутствуют. При случайном приеме препарата внутрь специфические симптомы отсутствуют. Возможно возникновение тошноты, рвоты, диареи, головной боли, обморока, чувства тревоги. Лечение: стандартные меры неотложной помощи, достаточное поступление жидкости в организм, создание кислой реакции мочи для предотвращения кристаллурии.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие Офтоципро мази глазной с другими препаратами при одновременном применении не выявлено. Имеются сведения, что системное применение некоторых хинолонов приводит к повышению концентрации теофиллина в плазме крови, влияет на метаболизм кофеина и усиливает действие пероральных антикоагулянтов (в т.ч. Варфарин и его производные). Сообщалось о временном повышении уровня креатинина в сыворотке крови у пациентов, которым назначали циклоспорин вместе с системным применением ципрофлоксацина.

Особые указания

В период лечения препаратом не рекомендуется ношение контактных линз. При использовании других офтальмологических лекарственных средств интервал между их введением должен составлять не менее 5 минут.Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами: Сразу после использования глазной мази возможна нечеткость зрительного восприятия, что может повлечь затруднение при управлении транспортными средствами и при работе с механизмами, рекомендуется приступать к работе (вождению) через 15 минут после применения препарата.

Условия хранения

При температуре от 2 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.