Инструкция по применению
Офтолик БК Капли глазные 0,4 мл 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Индия
Производитель: Сентисс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Повидон+Поливиниловый спирт
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 14 мг+6 мг/1 мл
Срок годности: 1.0

Описание

Скидка по программе "Зрение в центре внимания" от СентиссРус Программа «Зрение в центре внимания» - официальная программа лекарственной поддержки пациентов ООО «Сентисс Рус», предоставляющая возможность получения скидки по электронным картам Программы (штрихкодам) на ряд офтальмологических препаратов. Подробности условий и регистация в программе - на сайте vnimaniezrenie.ru Акция действует до 31.12.2024

Действующее вещество

Повидон+Поливиниловый спирт

Состав

В 1 мл содержится: повидон 6 мг, поливиниловый спирт 14 мг. Вспомогательные вещества: динатрия эдетат, натрия хлорид, натрия гидроксид, хлористоводородная кислота, вода д/и.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Системная абсорбция препарата с поверхности глаза минимальна: после закапывания 2 кап. Офтолика в каждый глаз концентрация активных веществ препарата в плазме через 4 ч остается ниже возможного предела количественного определения (10 нг/мл)

Показания

Чувство жжения, раздражения и дискомфорта, вызванные сухостью глаза;— в качестве заменителей слезы в случае снижения секреции слезной жидкости;— синдром сухого глаза;— прочие состояния, требующие смягчения и/или увлажнения роговицы

Способ применения и дозы

Дозирование: Назначают по 1-2 капли 3-4 раза/сут. в оба глаза, в зависимости от выраженности симптомов

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата Офтолик БК

Применение при беременности и кормлении грудью

Достаточного опыта по применению препарата при беременности и в период лактации нет.Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции к компонентам препарата

Передозировка

Данные о передозировке препарата не предоставлены

Взаимодействие с другими препаратами

Поливиниловый спирт подвергается реакции этерификации, характерной для соединений с вторичными гидрокси-группами. Он разрушается в сильных кислотах и размягчается или растворяется в слабых кислотах и щелочах. В высоких концентрациях поливиниловый спирт несовместим с неорганическими солями, особенно, фосфатами и сульфатами. Образование осадка 5% поливинилового спирта может быть вызвано реакцией с фосфатами. Образование геля из раствора поливинилового спирта может происходить в присутствии буры. Раствор повидона совместим со многими неорганическими солями, натуральными и синтетическими смолами и другими веществами. Взаимодействует в растворе с сульфатиазолом, натрия салицилатом, салициловой кислотой, фенобарбиталом, танином и другими веществами. Эффективность некоторых консервантов (например, тиомерсал) может снижаться из-за формирования комплексов с повидоном

Особые указания

Противопоказано использовать препарат, если изменился цвет раствора или он стал мутным. В целях предотвращения инфицирования слизистой оболочки глаза необходимо следить за тем, чтобы кончик пипетки во время применения препарата не касался кожи, поверхности глаза или других поверхностей. Пациент должен прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом, если:— при применении капель боль усиливается;— ухудшается зрение;— симптомы сохраняются более 72 ч;— сохраняется покраснение и раздражение глаз.Препарат содержит бензалкония хлорид, поэтому нельзя надевать контактные линзы в течение 20 мин после применения капель

Условия хранения

Не допускать замерзания