Инструкция по применению
Офтолик Капли глазные 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли глазные
Страна: Индия
Производитель: Сентисс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливиниловый спирт
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 14 мг+6 мг/1 мл
Срок годности: 24

Действующее вещество

Поливиниловый спирт

Состав

Действующее вещество: поливиниловый спирт - 14 мг, повидон - 6 мг/1 мл. Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, динатрия эдетат, натрия хлорид, вода для инъекций. Концентрация действующего вещества (мг): 20 мг.

Форма выпуска

Капли глазные

Фармакокинетика

Системная абсорбция препарата с поверхности глаза минимальна: после закапывания 2 кап. Офтолика в каждый глаз концентрация активных веществ препарата в плазме через 4 ч остается ниже возможного предела количественного определения (10 нг/мл).

Показания

Чувство жжения, раздражения и дискомфорта, вызванные сухостью глаза. В качестве заменителей слезы в случае снижения секреции слезной жидкости. Синдром сухого глаза или любые другие состояния, требующие смягчения и увлажнения роговицы.

Способ применения и дозы

По 1 - 2 капли 3 - 4 раза в день в оба глаза, в зависимости от выраженности симптомов. Перед применением препарата вымыть руки. Встряхнуть флакон и удалить крышку. Убедиться, что кончик пипетки не касается кожи или поверхности глаза, чтобы не допустить попадания инфекции. Откинуть голову назад, оттянуть нижнее веко вниз, перевернуть флакон и закапать необходимое количество капель в конъюнктивальный мешок.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Достаточного опыта по применению препарата при беременности и в период лактации нет. Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата

Передозировка

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

Взаимодействие с другими препаратами

Поливиниловый спирт подвергается реакции этерификации, характерной для соединений с вторичными гидрокси-группами. Он разрушается в сильных кислотах и размягчается или растворяется в слабых кислотах и щелочах. В высоких концентрациях поливиниловый спирт несовместим с неорганическими солями, особенно, фосфатами и сульфатами. Образование осадка 5% поливинилового спирта может быть вызвано реакцией с фосфатами. Образование геля из раствора поливинилового спирта может происходить в присутствии буры.Раствор повидона совместим со многими неорганическими солями, натуральными и синтетическими смолами и другими веществами. Взаимодействует в растворе с сульфатиазолом, натрия салицилатом, салициловой кислотой, фенобарбиталом, танином и другими веществами. Эффективность некоторых консервантов (например, тиомерсал) может снижаться из-за формирования комплексов с повидоном.

Особые указания

Не использовать препарат, если изменился цвет раствора или он стал мутным. В целях предотвращения инфицирования слизистой оболочки глаза необходимо следить за тем, чтобы кончик пипетки во время применения препарата не касался кожи, поверхности глаза или других поверхностей. Пациент должен прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом, если:при применении капель боль усиливается,ухудшается зрение,- симптомы сохраняются более 72 ч,сохраняется покраснение и раздражение глаз.Препарат содержит бензалкония хлорид, поэтому нельзя надевать контактные линзы в течение 20 мин после применения капель.

Условия хранения

В сухом месте