Инструкция по применению
Оксикорт аэрозоль 55 мл

Характеристики



Форма выпуска: Аэрозоль
Страна: Польша
Производитель: Polfa Tarchomin
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гидрокортизон+Окситетрациклин
Количество в упаковке: 1

Описание

Аэрозоль Оксикорт - препарат для наружного применения, обладающий сочетанным действием двух активных компонентов Окситетрациклина и гидрокортизона. Окситетрациклин - антибиотик из группы тетрациклинов широкого спектра действия. Оказывает бактериостатическое действие на некоторые грамположительные бактерии: стрептококки, грамотрицательные бактерии, палочки, кокки. Гидрокортизон является синтетическим глюкокортикостероидом коры надпочечников. Обладает противовоспалительным, противоаллергическим, противозудным и противоотечным действием.

Действующее вещество

Гидрокортизон+Окситетрациклин

Состав

Гидрокортизон, окситетрациклин, сорбитантриолеат, лецитин, изопропилмиристат, дривосоль 35А.

Форма выпуска

Аэрозоль

Фармакокинетика

Окситетрациклин при наружном применении практически не всасывается в кровь и не оказывает системного действия. Гидрокортизон может незначительно проникать в системный кровоток, подвергается метаболизму в печени, выводится почками. Нарушение целостности кожных покровов, воспалительные и другие патологические процессы кожи, окклюзионная повязка способствуют всасыванию препарата.

Показания

Хроническая пиодермия (стрептококковая, стафилококковая, смешанная), хронические гнойные осложнения аллергических заболеваний кожи, аллергический дерматит, экзема, почесуха (в т.ч. детская), контактный дерматит, импетиго (вульгарное, буллезное), бактериальная опрелость, фурункулы, фурункулез, множественные абсцессы, крапивница, укусы насекомых.

Способ применения и дозы

Пораженные участки орошают аэрозолем, держа флакон в вертикальном положении на расстоянии приблизительно 15 - 20 см от поверхности, в течение 1 - 3 сек. Процедуру повторяют 2 - 4 раза на день. Следует защищать глаза от действия аэрозоля, не вдыхать препарат.

Противопоказания

Гиперчувствительность, вирусные заболевания кожи (герпес, ветряная оспа), туберкулез кожи, грибковые заболевания кожи, новообразования и предраковые состояния кожи.

Применение при беременности и кормлении грудью

Оксикорт не рекомендуется при беременности, особенно для длительного применения и на обширных участках кожи. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Раздражение кожи в месте нанесения (особенно в случаях аллергии на компоненты препарата), вторичные инфекции, вызванные грибами или резистентными к окситетрациклину микроорганизмами.

Особые указания

Не применять на слизистые оболочки.