**Инструкция по применению**
**Оксолиновая Мазь 0,25 % 25 г**

### Характеристики




Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,25%
Срок годности: 24

### Описание

Мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

### Действующее вещество

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин

### Состав

Действующее вещество: диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин) - 0,25 г.
Вспомогательные вещества: парафин жидкий (вазелиновое масло) - 0,5 г, вазелин - до 100 г.

### Форма выпуска

Мазь

### Фармакокинетика

При нанесении на слизистую оболочку носа всасывается до 20 % препарата. В организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.

### Показания

Профилактика гриппа, лечение вирусных ринитов.

**Способ применения и дозы**

Местно. Для профилактики гриппа: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают ежедневно 2- 3 раза в день слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом. Лечение вирусного ринита: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают слизистую оболочку носа 2-3 раза в день в течение 3-4 дней. Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

**Побочные действия**

Быстропроходящее чувство жжения слизистой оболочки носа, ринорея. В редких случаях возможно синее окрашивание слизистой оболочки носа. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка**

Случаи передозировки препарата не описаны.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Не изучалось.

**Особые указания**

Избегать попадания препарата в глаза. При случайном попадании тщательно промыть водой.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

**Условия хранения**

При температуре от 2 до 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.