Инструкция по применению
Октенисепт Раствор 1 л

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Schulke & Mayr
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Средство для стерилизации и дезинфекции.

Состав

Октенидина дигидрохлорид.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Атисептическая обработка слизистых оболочек и прилегающих к ней тканей, кожи. Обработка раневых поверхностей (включая пупочные раны новорожденных, гнойные раны в хирургической и акушерской практике), пролежни, язвы (включая гангренозные), обработка операционного поля до, в процессе и после проведения хирургических, диагностических и других манипуляций, при травмах (включая переломы), ожогах (глубоких и поверхностных), обработка ссадин, трещин (например сосков молочной железы при кормлении грудью), послеоперационных швов, лечение и профилактика воспаления половых органов, мочевыводящих путей (включая заболевания, передающиеся половым путем), профилактика и лечение инфекций ротовой полости, носоглотки, глаз, антисептическое промывание полостей (включая гайморовые, лобные придаточные пазухи носа, брюшную полость), мытье тела больных с мультирезистентным золотистым стафилококком. Гигиеническая и хирургическая обработка рук персонала, профилактика внутрибольничного и профессионального инфицирования ВИЧ и гепатитами при попадании контагиозного материала на слизистые оболочки (в том числе глаз) и кожу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно.

Особые указания

При случайном попадании значительного количества препарата в желудок промыть большим количеством воды и принять активированный уголь. При применении в полости рта не глотать. Не вводить в ткань под давлением. При орошении полостей необходимо оставлять точку дренажа. Применение в период беременности и кормления грудью. Во время беременности препарат применяют без ограничений. При применении в период кормления грудью для обработки трещин сосков следует избегать попадания препарата в ЖКТ ребенка. Дети. Можно применять у детей в таких же дозах, как и у взрослых. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.

Условия хранения

Беречь от детей.