Инструкция по применению
Окуметил Капли глазные 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: ВИПС
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Дифенгидрамин+Нафазолин+Цинка сульфат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10 мг+10 мг+10 мг/10 мл
Срок годности: 36

Действующее вещество

Дифенгидрамин+Нафазолин+Цинка сульфат

Состав

Дифенгидрамина гидрохлорид 1 мг,нафазолина гидрохлорид 1 мг,цинка сульфат 1 мгВспомогательные вещества: натрия цитрат 14 мг, лимонная кислота 0.6 мг, бензалкония хлорид 0.2 мг, краситель синий метиленовый 0.03 мг, натрия хлорид 3.2 мг, гипромеллоза 4000 0.25 мг, натрия гидроксид 0.3 мг, вода дистиллированная до 1 мл.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При местном применении подвергается системной абсорбции. Сведений о степени проникновения в различные ткани глаза после местного применения.

Показания

- хронический неспецифический конъюнктивит и блефароконъюнктивит;- аллергический конъюнктивит и блефароконъюнктивит;- ангулярный конъюнктивит;- уменьшение симптомов раздражения тканей глаза (покраснение, зуд, ощущение инородного тела).

Способ применения и дозы

Местно. Если нет иных предписаний врача, то закапывать по 1 капле в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (глаз) 2-3 раза в день.Если во время применения препарата в течение 72 часов не наблюдается уменьшение симптомов, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;- закрытоугольная глаукома;- синдром сухого глаза;- беременность;- лактация;- гиперплазия предстательной железы, стенозирующая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, стеноз шейки мочевого пузыря;- бронхиальная астма;- эпилепсия;- сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, артериальная гипертония);- феохромоцитома;- гиперфункция щитовидной железы;- сахарный диабет;- выраженный атеросклероз;- детский возраст до 2-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Побочные действия

После закапывания возможно появление чувства легкого жжения, затуманивания зрения, развитие аллергических реакций. При афакии возможно развитие макулопатии и появление центральной скотомы. В этом случае отмена препарата ведет к обратному развитию симптомов.После местного использования нафазолина, входящего в состав Окуметила, может возникнуть реактивная гиперемия и отек слизистой оболочки глаз, расширение зрачка, повышение ВГД (внутриглазное давление). При продолжительном использовании явление раздражения тканей возникают наиболее часто.Так как при местном применении нафазолин оказывает общерезорбтивное действие, то возможно развитие тахикардии, повышение артериального давления, тошноты, головной боли.При местном применении дифенгидрамина возможно развитие побочных эффектов как местного, так и системного характера: парез аккомодации, фотосенсибилизация, сухость и онемение слизистой оболочи глаз, сонливость, слабость, снижение психомоторных реакций и нарушение координация движений, головокружение.При длительном применении солей цинка возможно появление сухости слизистой оболочки глаз.

Передозировка

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Так как возможно взаимное уменьшение эффектов дифенгидрамина и лекарственных препаратов, стимулирующих ЦНС, не рекомендуется применение препарата Окуметил у больных, использующих данные препараты.Окуметил не следует применять одновременное ингибиторами МАО и в течение 10 дней после прекращении их приема. В результате совместного применения бета-адреноблокаторов, ингибиторов МАО с адреномиметиками, происходит усиление действия последних.Нафазолин замедляет всасывание местноанестезирующих средств, поэтому не рекомендуется совместное применение препарата Окуметил с местными анестетиками, применяемыми в офтальмологии.Сульфат цинка фармацевтически не совместим с солями серебра, свинца, хинином, ихтиолом, цитралем, протарголом, щелочнореагирующими веществами.

Особые указания

Во избежание загрязнения раствора, храните флакон плотно закрытым и избегайте соприкосновения кончика пипетки с какой-либо поверхностью.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ течение 10-15 минут после инсталляции возможно снижение остроты зрения, в связи с чем необходимо соблюдать осторожность при вождении автомобиля и при работе с механизмами.

Условия хранения

В сухом месте