Инструкция по применению
Олестезин Суппозитории ректальные 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бензокаин+Облепихи крушиновидной плодов масло+Сульфаэтидол
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 330 мг+50 мг+100 мг
Срок годности: 24.0

Описание

Суппозитории от темно-оранжевого до красновато-коричневого цвета, торпедообразной формы.

Действующее вещество

Бензокаин+Облепихи крушиновидной плодов масло+Сульфаэтидол

Состав

Состав на один суппозиторий: Действующие вещества: облепихового масла концентрат (с содержанием суммы каротиноидов в пересчете на &beta,-каротин 300 мг/%) * 330 мг сульфаэтидол (этазол-натрий) * 50 мг бензокаин (анестезин) * 100 мг Вспомогательные вещества: полисорбат 80 (твин 80) - 40 мг, макрогол 400 (полиэтиленоксид 400) - 60 мг, макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) - 980 мг, макрогол 4000 (полиэтиленоксид 4000) - достаточное количество для получения суппозитория массой 2,35 г.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Геморрой, анальные трещины, анальный зуд.

Способ применения и дозы

Ректально после гигиенических процедур по 1 суппозиторию 2 раза в сутки. При необходимости по 2-3 суппозитория 2 раза в сутки. Курс лечения - 5-7 дней (не более 10 дней). Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Общие расстройства и нарушения в месте введения Местное раздражение, отек, сыпь в месте введения. Нарушения со стороны иммунной системы Аллергические реакции. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта Диарея. Нарушения со стороны крови и лимфатической системы Метгемоглобинемия. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей Синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы В случае значительного превышения рекомендованных разовых и суточных доз препарата может произойти передозировка бензокаина. Симптомы передозировки могут проявляться сонливостью, беспокойством, возбуждением, в тяжелых случаях - судорогами. Крайне редко большие дозы бензокаина могут вызвать метгемоглобинемию, которая проявляется дыхательными расстройствами и цианозом. Лечение Внутривенное введение метиленового синего является специфическим средством в лечении этого состояния.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Данные о влиянии препарата на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами) отсутствуют.

Условия хранения

В сухом месте