Инструкция по применению
Олиговит таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Сербия
Производитель: ГАЛЕНИКА АД
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой, красного цвета.

Состав

Ретинола ацетата 5000 МЕ, Колекальциферола 500 МЕ, Альфа-токоферола ацетата 50 % 12,50 мг, Тиамина гидрохлорида 5,00 мг, Рибофлавина 5,00 мг, Никотинамида 50,00 мг, Пантотената кальция 10,00 мг, Пиридоксина гидрохлорида 2,50 мг, Циаиокобаламина 0,1 % 0,0025 мг, Аскорбиновой кислоты 100,00 мг, Кальция гидрофосфата дигидрат 200,00 мг, Железо (в форме высушенного железа (II) сульфата) 10,00 мг, Магний (в форме тяжелого оксида магния) 3,00 мг, Калий (в форме сульфата калия) 2,50 мг, Цинк (в форме цинка сульфата гептагидрата) 0,75 мг, Медь (в форме сульфата пентагидрата меди) 0,50 мг, Марганец (в форме сульфата моногидрата марганца) 0,50 мг, Фтор (в форме натрия фторида) 0,50 мг, Молибден (в форме натрия молибдата дигидрата) 0,10 мг, Кобальт (в форме кобальта (II) сульфата) 0,05 мг.Вспомогательные вещества:Частично прежелатинизированный кукурузный крахмал 1500 12,78 мг, коповидон УА 64 35,00 мг, тальк 35,00 мг, кроскармеллоза натрия 35,00 мг, карбоксиметилкрахмал натрия 56,00 мг, стеариновая кислота 10,50 мг.Сахарная оболочка:Опаглос регуляр (33 % раствор шеллака) 3,80 мг, сахароза 237,00 мг, тальк 56,20 мг, акация 2,41 мг, красителя азорубиина алюминиевый лак (Е 122) 0,30 мг, красителя солнечного заката желтого алюминиевый лак (Е 110) 0,29 мг, воск карнаубский - следы присутствия.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Олиговит применяется для профилактики гиповитаминозов и дефицита минералов, входящих в состав препарата, при неполноценном питании.

Способ применения и дозы

Олиговит, таблетки, покрытые оболочкой, принимают внутрь. Принимайте по одной таблетке, покрытой оболочкой, в сутки после еды, запивая небольшим количеством жидкости. Без консультации с врачом препарат можно принимать в течении 30 дней, затем рекомендуем обратиться к врачу по вопросу продолжения терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, в период беременности и грудного вскармливания, в детском возрасте, при гипервитаминозе A, E, D, при тиреотоксикозе, декомпенсированной сердечной недостаточности, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, повышенном содержании кальция (гиперкальцисмии), если у Вас наблюдаются нарушения, в результате которых происходит процесс накопления железа в организме (например: гемохроматоз). При непереносимости к сахарозе, сообщите об этом врачу до приема препарата, так как это вещество входит в его состав.

Применение при беременности и кормлении грудью

Олиговит противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Учитывая информацию относительно возможного действия активных веществ, входящих в состав препарата, приводится перечень возможных побочных эффектов. В случае возникновения побочных эффектов необходимо обратиться к врачу. Нарушения со стороны иммунной системы:у пациентов с гиперчувствительностью возможны аллергические реакции, включая анафилактический шок, ангионевротический отек, гипертермию, кожную сыпь, крапивницу, зуд, покраснение кожи, редко - бронхоспазм и др.Желудочно-кишечные расстройства:диспепсические расстройства, тошнота/рвота, абдоминальная боль, отрыжка, запор, диарея, увеличение секреции желудочного сока, изжога.Нарушения со стороны нервной системы:головная боль, головокружение, повышенная возбудимость, сонливость. Другие:нарушения зрения, потливость, возможна окраска мочи в желтый цвет. При долговременном применении в больших дозах могут возникнуть: раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, гиперкальциемия, гиперкальциурия, аритмии, парестезии, гиперурикемия, снижение толерантности к глюкозе, гипергликемия, транзиторное повышение активности АС'Г, лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, нарушение функции почек, сухость и трещины на ладонях и ступнях, алопеция, себорейные высыпания.Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Если Вы приняли больше прописанной дозы препарата Олиговит, то сразу обратитесь к своему врачу или фармацевту!Не отмечены случаи передозировки препаратом Олиговит. После приема больших количеств препарата возможно появление тошноты, рвоты, диареи, болей в животе, появление крови в рвотной массе, кровотечений из конечной части толстой кишки. В случае появления перечисленных симптомов, указывающих на передозировку железом, входящим в состав препарата Олиговит, следует сразу же обратиться к врачу для принятия неотложных мер.При передозировке, развивающейся на фоне приема высоких доз препарата более 1 месяца, может развиться гипервитаминоз витаминов А и О. Симптомы гипервитаминоза А: усталость, раздражительность, анорексия, снижение массы тела, рвота и другие пищеварительные расстройства, субфебрильная температура, увеличение печени, изменения на коже (желтушность и сухость кожи, повышенная чувствительность к солнечному свету), зуд, алопеция, сухость волос, образование трещин на губах и кровотечение, анемия, головная боль, гиперкальциемия, отек подкожной ткани, ночное мочеиспускание, боли в костях и суставах. Симптомы хронической токсичности: повышение внутричерепного давления, отек диска глазного нерва и тяжелые поражения зрения. Симптомы острой токсичности: седативный эффект, ошеломление, смущение, поносы и рвота, боль и кровоточивость десен, шелушение кожи, повышение внутричерепного давления, сопровождаемое головной болью. Возможны и увеличение печени, нарушение зрения и повышенная возбудимость.Избыточное поступление витамина 13 приводит к развитию гиперфосфатемии или гиперкальциемии. В результате гиперкальцием и и могут возникнуть гиперкальциурия, эктопические кальцификации, поражения печени и сердечно-сосудистые поражения. Симптомы передозировки: анорексия, усталость, тошнота, рвота, запор или понос, полиурия, ноктурия, повышенное потоотделение, головная боль, чувство жажды, сонливость и головокружение. При наличии признаков токсичности необходимо прекратить прием витамина.

Взаимодействие с другими препаратами

Следует иметь в виду, что данная информация может иметь отношение и к лекарствам, которые Вы больше не принимаете, и к лекарствам, которые Вы планируете принимать в будущем. Перед приемом препарата Олиговит проинформируйте своего врача или фармацевта о том, какие препараты Вы принимаете или недавно принимали, включая и препараты, которые выдаются без рецепта врача.Во время приема препарата употребление алкоголя допустимо только в небольших количествах, поскольку алкоголь уменьшает абсорбцию некоторых витаминов.Витамины А и Е взаимно усиливают действие и являются синергистами. Ретинол снижает противовоспалительное действие глюкокортикоидов. Нитриты и холестирамин нарушают всасываемость ретинола, поэтому не рекомендовано их одновременное применение с препаратом. В связи с возможностью развития гипервитаминоза А не рекомендуется совместное применение препарата с другими препаратами, содержащими витамин А.Витамин А не назначается одновременно с ретиноидами, их комбинация является токсичной.Альфа-токоферола ацетат нельзя применять вместе с препаратами железа, серебра, средствами, имеющими щелочную реакцию (натрия гидрокарбонат, трисамин, и т.д.), антикоагулянтам и непрямого действия (дикумарин, неодикумарин и т.д.).Витамин Е усиливает эффект стероидных и нестероидных противовоспалительных средств (натрия диклофенака, ибупрофсна, преднизолона и т.д.).Витамин С повышает всасываемость железа, усиливает токсичность сульфаниламидов (возможность кристаллурии), пенициллинов, снижает эффективность гепарина и непрямых коагулянтов. Всасываемость витамина С уменьшается при одновременном применении с пероральными контрацептивами. Витамин С может приводить к псевдонегативному результату анализа на содержание глюкозы в моче. Это надо принять во внимание больным сахарным диабетом.Витамин В6 ослабляет действие леводопы, предотвращает или уменьшает токсические проявления, которые наблюдаются при применении изониазида или других противотуберкулезных средств.Витамин В1, влияя на процессы поляризации в области нервно-мышечных синапсов, может ослаблять кураreподобное действие. ПАСК, циметидин, препараты кальция алкоголь уменьшают всасываемость витамина В12.Витамин В2 несовместим со стрептомицином, уменьшает эффективность антибактериальных препаратов (окситстрациклина, доксициклина, эритромицина, тетрациклина и линкомицина). Поэтому его следует принимать как минимум за 3 часа до приема антибиотика. Трициклические антидепрессанты, имипрамин и амитриптидин, ингибируют метаболизм рибофлавина, особенно в тканях сердца.

Особые указания

Если вы забыли принять препарат Олиговит:Никогда не принимайте двойную дозу, чтобы возместить пропущенный прием препарата!В случае, если Вы плохо переносите любой из сахаров, то сообщите об этом врачу до приема препарата, так как сахароза входит в его состав.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Олиговит таблетки, покрытые оболочкой, не влияют на способность управления автотранспортом и работу с механизмами.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке.Хранить в недоступном для детей месте!