# Инструкция по применению
# Омегика Капсулы 30 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Польша
Производитель: Петровакс
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



**Описание**

OMEGIKA 500 мг Омега-3 + Витамин К2 - особая комбинация для поддержания красоты и молодости, а также жизненно важных функций организма: здоровья сосудов и сердца. Развитие сердечно-сосудистых патологий (в том числе тромбообразование, повышение уровня холестерина, триглицеридов); ухудшение состояния кожи, волос, ногтей; снижение остроты зрения, концентрации внимания; нарушение памяти; общая утомляемость и ослабление иммунитета - все эти и многие другие проблемы могут свидетельствовать о недостатке полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) Омега-3. Наиболее дефицитные из них - эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). ЭПК, ДГК и Витамин К2 играют незаменимую роль в поддержании обмена веществ, улучшении общего состояния здоровья и снижении рисков и тяжести многих заболеваний. Преимущества OMEGIKA: Качество, которое видно Кристально чистый концентрат Омега-3 (цветность по шкале Гарднера менее 1.5) из рыб тихоокеанского происхождения, изготовленный по стандартам GMP в непосредственной близости от мест вылова. Комбинация Омега-3 + Витамин К2 произведена в Европейском Союзе. Оптимальная дозировка, рекомендованная ВОЗ и GOED Суточная доза ЭПК + ДГК в составе OMEGIKA соответствует рекомендациям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и GOED (Глобальной организации по ЭПК и ДГК Омега-3 кислот). Подходит и для здоровой популяции (1 капсула в сутки), и для популяции с наличием значимых патологий, в том числе сосудов и сердца (2 капсулы в сутки). Удобный приём Капсулы небольшого размера с лимонным запахом и вкусом. Синергия компонентов в составе OMEGIKA Омега-3 кислоты поддерживают: состояние ногтей и кожи, ее барьерную функцию; здоровый блеск, текстуру волос и их устойчивость к выпадению; работу сердечно-сосудистой и эндокринной системы; иммунитет; нормальную работу головного мозга; здоровье глаз. Помогают: ускорять обмен веществ; снижать течение хронического воспаления, в том числе в суставах; контролировать уровень холестерина, триглицеридов, артериального давления. Витамин К2 поддерживает: упругость кожи, препятствуя кальцификации эластина; эластичность артерий, регулируя обмен кальция; энергетический обмен в клетках; плотность костей, что особенно важно в период менопаузы; когнитивные функции, снижая нейровоспаление и нейродегенерацию. Помогает: улучшать проходимость сосудов; снижать риски отложения соединений кальция на стенках сосудов, в почках, хряще.

**Состав**

Рыбий жир, желатин*, глицерин (Е422)*, натуральный ароматизатор (вкус лимонного сока)**, витамин К2 (менахинон (МК-7)), вода. * компоненты оболочки капсулы. ** компонент содержимого капсулы и оболочки капсулы. Количество в суточной дозе (1 капсула / 2 капсулы): Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) Омега-3 - не менее 500 мг / не менее 1000 мг; Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) - не менее 248 мг / не менее 496 мг; Докозагексаеновая кислота (ДГК) - не менее 173 мг / не менее 346 мг; Витамин К2 - 22,5 мкг/ 45,0 мкг

**Форма выпуска**

Капсулы

**Показания**

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот омега-3 (в том числе докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислот) и витамина К2, в том числе для беременных и кормящих женщин.

**Способ применения и дозы**

Взрослым по 1-2 капсуле в день во время еды, беременным и кормящим женщинам по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости курс приема можно повторить.

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, детский возраст до 18 лет. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача.

**Особые указания**

Биологически активная добавка (БАД) к пище. Не является лекарственным средством. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.  Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача.