Инструкция по применению
Омез капсулы 10 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: капсулы кишечнорастворимые
Страна: Испания
Производитель: Др.Реддис
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Омепразол
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 10 мг
Срок годности: 3 года



Описание

Омез - лекарственный препарат для снижения кислотности желудочного сока. Действующее вещество - омепразол.Омепразол относится к ингибиторам протонного насоса и подавляет заключительную стадию образования соляной кислоты в желудке. Препарат применяется у взрослых при симптомах диспепсии, связанных с повышенной кислотностью желудочного сока, включая изжогу и кислую отрыжку, а также для длительной поддерживающей терапии с целью профилактики рецидивов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и язвы двенадцатиперстной кишки. Твердые желатиновые капсулы размера 4 с зеленой крышечкой и белым корпусом содержат сферические гранулы от белого до почти белого с желтоватым оттенком цвета. В упаковке 30 капсул - 2 блистера по 15 капсул.

Действующее вещество

Омепразол

Состав

Каждая капсула содержит 10 мг омепразола.Вспомогательные вещества: сахарные сферы размером 0,6-0,71 мм, содержащие сахарозу, крахмал кукурузный и воду очищенную, магния гидроксид в составе премикса с крахмалом кукурузным, динатрия фосфат, гипромеллоза тип 2910, натрия лаурилсульфат, маннитол, карбоксиметилкрахмал натрия тип А.Промежуточное покрытие: гипромеллоза тип 2910, тальк, титана диоксид Е171. Кишечнорастворимое покрытие: макрогол 6000, тальк, полисорбат 80, метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер 1:1.Крышечка капсулы: краситель бриллиантовый голубой FCF FD&C Blue 1 E133, краситель железа оксид желтый Е172, желатин. Корпус капсулы: титана диоксид Е171, желатин.

Форма выпуска

капсулы кишечнорастворимые

Фармакокинетика

Омепразол абсорбируется в тонкой кишке обычно в течение 3-6 часов. Биодоступность после приема внутрь составляет приблизительно 60 %. Прием пищи не влияет на биодоступность. Связь с белками плазмы крови составляет около 95 %, объем распределения - 0,3 л/кг.Омепразол полностью метаболизируется в печени с участием изоферментов CYP2C19 и CYP3A4. Метаболиты не оказывают значительного влияния на секрецию соляной кислоты. Общий плазменный клиренс составляет 0,3-0,6 л/мин. При повторном приеме биодоступность увеличивается приблизительно на 50 % по сравнению с разовой дозой.Период полувыведения составляет около 40 минут. Около 80 % омепразола выводится в виде метаболитов почками, остальная часть - через кишечник.Значительных изменений биодоступности у пациентов пожилого возраста и пациентов с нарушением функции почек не отмечено. При нарушении функции печени биодоступность увеличивается, а плазменный клиренс значительно уменьшается.

Показания

Препарат применяют у взрослых:при симптомах диспепсии, связанной с повышенной кислотностью желудочного сока, включая симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, изжогу и кислую отрыжкудля длительной поддерживающей терапии с целью профилактики рецидивов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и изжогидля длительной поддерживающей терапии с целью профилактики рецидивов язвы двенадцатиперстной кишки

Способ применения и дозы

Внутрь.Препарат принимают в дозе 10 мг один раз в сутки.Капсулу рекомендуется принимать утром перед едой или во время приема пищи, запивая небольшим количеством воды. Содержимое капсулы нельзя разжевывать.При затруднении проглатывания капсулу можно вскрыть и проглотить ее содержимое или смешать содержимое со слегка подкисленной жидкостью, например соком, яблочным пюре или йогуртом. Полученную суспензию используют сразу или в течение 30 минут.При отсутствии эффекта в течение трех дней необходим осмотр специалиста. Максимальный курс лечения без консультации врача - 14 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность к омепразолу, замещенным бензимидазолам или любому вспомогательному веществу препаратаОдновременное применение с эрлотинибом или позаконазоломДетский возраст до 18 летДефицит сахаразы или изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Омез может применяться во время беременности. Результаты исследований не выявили неблагоприятного воздействия омепразола на здоровье беременных женщин, плод или новорожденного.Омепразол проникает в грудное молоко, однако при применении в терапевтических дозах воздействие на ребенка маловероятно.

Передозировка

Разовые дозы омепразола до 400 мг не вызывали тяжелых симптомов. При приеме взрослыми 560 мг отмечалась умеренная интоксикация.Возможные симптомы: головокружение, спутанность сознания, апатия, головная боль, расширение сосудов, тахикардия, тошнота, рвота, метеоризм и диарея.Лечение симптоматическое. При необходимости проводят промывание желудка и назначают активированный уголь.

Особые указания

Перед применением необходимо исключить злокачественное новообразование при значительной спонтанной потере массы тела, повторной рвоте, дисфагии, рвоте с кровью, мелене, язве желудка или подозрении на нее. Лечение может сгладить симптомы и отсрочить постановку диагноза.Не рекомендуется совместное применение с атазанавиром и нелфинавиром. Следует избегать одновременного применения омепразола и клопидогрела.Пациенты с риском остеопороза или связанных с ним переломов должны находиться под клиническим наблюдением. Омепразол может повышать концентрацию хромогранина А и влиять на результаты обследования для выявления нейроэндокринных опухолей. Прием ингибиторов протонного насоса необходимо прекратить не менее чем за 5 дней до определения концентрации хромогранина А.Препарат содержит сахарозу. Его не следует принимать при непереносимости фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбции или дефиците сахаразы-изомальтазы.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.