Инструкция по применению
Ондансетрон Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл ампулы 2 мл 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Россия
Производитель: Сотекс
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ондансетрон
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 2 мг/мл

Действующее вещество

Ондансетрон

Состав

1 мл ондансетрон (в форме гидрохлорида дигидрата) 2 мг. Вспомогательные вещества: натрия дисульфит - 1 мг, вода д/и - до 1 мл.

Форма выпуска

Раствор для инъекций

Показания

Профилактика тошноты и рвоты при проведении противоопухолевой химио- или лучевой терапии . профилактика и лечение тошноты и рвоты в послеоперационном периоде.

Способ применения и дозы

Индивидуальный, в зависимости от показаний и схемы лечения.

Противопоказания

I триместр беременности, повышенная чувствительность к ондансетрону.

Применение при беременности и кормлении грудью

Ондансетрон противопоказан к применению в I триместре беременности. При необходимости применения в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Со стороны ЦНС: головные боли . редко - транзиторные нарушения зрения и головокружение (при быстром в/в введении), непроизвольные движения. Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко - боли в груди, аритмии, брадикардия, артериальная гипотензия. Со стороны пищеварительной системы: запоры, диарея, боли в животе, транзиторное повышение уровня трансаминаз в сыворотке крови. Аллергические реакции: редко - бронхоспазм, ангионевротический отек, крапивница . в отдельных случаях - анафилактические реакции. Прочие: ощущение тепла и прилива крови к голове и эпигастральной области.

Особые указания

Со стороны ЦНС: головные боли . редко - транзиторные нарушения зрения и головокружение (при быстром в/в введении), непроизвольные движения. Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко - боли в груди, аритмии, брадикардия, артериальная гипотензия. Со стороны пищеварительной системы: запоры, диарея, боли в животе, транзиторное повышение уровня трансаминаз в сыворотке крови. Аллергические реакции: редко - бронхоспазм, ангионевротический отек, крапивница . в отдельных случаях - анафилактические реакции. Прочие: ощущение тепла и прилива крови к голове и эпигастральной области.