Инструкция по применению
Онихелп Лак для ногтей 5 % 5 мл

Характеристики



Форма выпуска: Лак
Страна: Хорватия
Производитель: Белупо
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аморолфин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%

Описание

Противогрибковый препарат для наружного применения.

Действующее вещество

Аморолфин

Состав

1 мл препарата содержит: действующее вещество: аморолфина гидрохлорид 55,74 мг (соответствует 50 мг аморолфина основания). Вспомогательные вещества: этанол – 482,53 мг, этилацетат – 144,59 мг, метилметакрилата, триметиламмониоэтилметакрилата хлорида и этилакрилата сополимер [2:0,2:1] (Эудрагит RL 100) – 127,60 мг, н-бутилацетат – 50,08 мг, триацетин – 10,45 мг.

Форма выпуска

Лак

Фармакокинетика

При нанесении на ногти проникает в ногтевую пластинку и далее в ногтевое ложе, практически полностью в течение первых 24 часов. Эффективная концентрация сохраняется в пораженной ногтевой пластинке в течение 7-10 дней уже после первой аппликации. Системная абсорбция незначительна: концентрация в плазме находится ниже предела чувствительности методов определения (менее 0,5 нг/мл).

Показания

• лечение грибковых поражений ногтей, вызванных дерматофигами, дрожжевыми и плесневыми грибами, • профилактика грибковых поражений ногтей.

Способ применения и дозы

Наружно. Наносить на пораженные ногти пальцев рук или ног 1-2 раза в неделю

Противопоказания

Повышенная чувствительность к аморолфину и другим компонентам препарата. Возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

При применении препарата Онихелп® нежелательные реакции отмечаются редко. Такие повреждения ногтей, как изменение цвета, разрушение ногтевых пластин, ломкость ногтей, могут быть следствием грибкового поражения ногтей. Все нежелательные реакции, отмеченные при применении препарата Онихелп®, представлены в таблице ниже, в соответствии с принятой классификацией по системам органов и частоте встречаемости: очень часто (≥10%), часто (≥1% и Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: редко – повреждение ногтей, изменение цвета, онихоклазия (ломкость ногтевой пластинки), онихорексис (хрупкость ногтевой пластинки), очень редко – ощущение жжения кожи, частота неизвестна – эритема, зуд, контактный дерматит, крапивница, образование волдырей. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

Препарат предназначен для наружного применения, поэтому, при случайном попадании препарата внутрь следует промыть желудок и провести симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось.

Особые указания

• Пилку, используемую для обработки пораженных ногтей, не следует применять для обработки здоровых ногтей! • Во время лечения следует избегать применения декоративного лака для ногтей и накладных искусственных ногтей. • Не допускать попадания лака в глаза, уши и на слизистые оболочки. • Препарат содержит этанол, поэтому слишком частое и неправильное его нанесение может привести к появлению раздражения или сухости кожи вокруг ногтя. • Салфетка содержит легко воспламеняющееся вещество. • Лицам, работающим с органическими растворителями (например, растворителями для краски, бензином, керосином и др.), следует надевать герметичные перчатки для защиты ногтей покрытых лаком. • Для предотвращения высыхания лака следует плотно закрывать крышку после использования. Чтобы крышка не прилипала, избегать попадания лака на резьбу. • Если Вы пропустили нанесение лака, не следует наносить его избыточное количество в несколько слоев, достаточно продолжить лечение согласно инструкции по применению. • Не выливать оставшийся препарат в месте слива воды или бытовых отходов. • Пациентам с состояниями, предрасполагающими к развитию грибковых поражений ногтей (нарушение периферического кровообращения, сахарный диабет, иммунодефицит), а также пациентам с дистрофией ногтя перед применением препарата рекомендуется обратиться к врачу. • В случае, если разрушению или грибковому поражению подвержено более 2/3 ногтевой пластинки, необходимо также обратиться к врачу для назначения сопутствующей пероральной терапии.

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С. Флакон следует хранить плотно закупоренным, в вертикальном положении, вдали от источника тепла. Хранить в недоступном для детей месте!