Инструкция по применению
Онкоксин Раствор 500 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Испания
Производитель: КАТАЛИСИС
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Описание

Биологически активная добавка к пище, не является лекарственным средством. Не может быть заменителем пищи или каких-либо лекарств.Онкоксин является онконутрицевтиком*, способствующим повышению функциональной активности иммунной системы, улучшению аппетита, снижению риска инфекций и предотвращению побочных эффектов противоопухолевой терапии. В состав Онкоксина входят витамины, аминокислоты, микроэлементы, дефицит которых наиболее характерен для опухолевого роста. Кроме того, Онкоксин содержит ряд биологически активных веществ, которые обладают антиоксидантным, гепатопротекторным и иммуномодулирующим действием. Сочетание свойств компонентов Онкоксина делает его ценным компонентом нутритивной поддержки у онкологических больных.Онкоксин может помочь быстрее восстановить вес или предотвратить его потерю, улучшить аппетит и общее самочувствие. После перенесённой химио- и лучевой терапии Онкоксин способствует нормализации функции иммунной системы и печени, а при приёме перед операцией имеет потенциал предотвращать послеоперационные осложнения. Компоненты Онкоксина важны для снижения риска инфекционных заболеваний, включая сезонные ОРЗ. Биологически активные вещества Глюкозамин. Обладает противовоспалительным эффектом. Есть данные, свидетельствующие о том, что глюкозамин снижает риск смерти от болезней лёгких. Глицирризиновая кислота. Иммуномодулятор, гепатопротектор. Кратно снижает частоту поражения печени при некоторых видах химиотерапии. Гепатопротекторный эффект усиливается при совместном применении с глицином и цистеином. Обладает прямым антимикробным действием в отношении

ряда клинически-значимых микроорганизмов (включая полирезистентные штаммы). При взаимодействии с цистеином и глюкозамином формирует конъюгаты с выраженной противовирусной активностью. Эпигаллокатехина галлат (ЭГКГ, основной полифенол зелёного чая). Мощный антиоксидант, благодаря чему обладает свойствами радиопротектора и хемопротектора,купирует поражение пищевода, вызванное лучевой терапией. Диета, богатая антиоксидантами, в том числе полифенолами, приводит к увеличению массы тела, улучшению аппетита, а также качества жизни у пациентов с синдромом анорексии-кахексии. Экстракт корицы. Источник соединений, обладающих антибактериальной активностью. Нормализует менструальный цикл.Аминокислоты Глицин. Обладает цитопротективным, противовоспалительным действием, способен снижать токсическое влияние на почки и печень ряда лекарственных средств. Снижает психоэмоциональное напряжение, уменьшает чувство тревоги и страха. Было показано, что назначение диеты, обогащённой глицином, у пациентов с высокотравматичными операциями по поводу новообразований ЖКТ помогает уменьшить интенсивность воспалительной реакции, частоту послеоперационных осложнений, включая инфекционные. Аргинин. Является одним из наиболее изученных иммуноактивных нутриентов (иммунонутриентов). Режимы питания, обогащённые аргинином, продемонстрировали свою эффективность при сепсисе у критически больных пациентов, а также при различных хирургических вмешательствах за счёт снижения частоты послеоперационных инфекционных осложнений. Аргинин предотвращает потерю мышечной массы прионкологических заболеваниях. Цистеин. Критически важен для функционирования ряда ключевых ферментативных антиоксидантных систем.Микроэлементы Цинк. Незаменимый микроэлемент. Иммунорегулятор и антиоксидант, обладает противовоспалительным эффектом. Принципиально важен для инициирования иммунного ответа, заживления ран. Профилактический приём позволяет существенно снизить частоту инфекционных заболеваний, в том числе и сезонных ОРЗ. Корректирует нарушения вкуса и стимулирует потребление пищи у онкологических больных. Марганец. Критически важен для функционирования ряда ферментативных антиоксидантных систем. Витамины Фолиевая кислота, витамины B12 (цианокобаламин), B6 (пиридоксин). Играют ключевую роль в поддержании структуры ДНК. Применение витаминов B12 и B6 способствует улучшению состояния при некоторых онкологических заболеваниях, а также может повысить эффективность химиотерапии. Витамин С (аскорбиновая кислота). Важнейший антиоксидант. Способствует процессам репарации, обладает иммунокорректирующим действием.При производстве Онкоксина используется уникальная технология молекулярной активации.Она позволяет: кратно увеличить антиоксидантную активность биологически активных веществ, входящих в его состав, создать стабильные супрамолекулярные комплексы глицирризиновой кислоты и аминокислот глицина*Онконутрицевтики – стандартизованные пищевые вещества,

витамины, микроэлементы, фитонутриенты фармакологического качества, которые предназначены для профилактики и устранения дефицита микронутриентов, характерного для злокачественных новообразований или связанного с противоопухолевым лечением. Онконутрицевтики являются компонентом нутритивной поддержки, имеющей своей целью предотвращение и коррекцию нежелательных явлений, инфекционных осложнений, восстановление массы тела. Фитонутриенты или фитохимические вещества представляют собой широкий спектр растительных веществ, таких как полифенолы, каротиноиды, ликопин, ресвератрол и фитостеролы, которые помогают поддерживать здоровье организма. Микронутриенты – незаменимые пищевые вещества (витамины и минералы), которые содержатся в пище в малых количествах.

Состав

Активные вещества содержание в 100 млГлицин - 2000 мг, Глюкозамин - 2000 мг, Яблочная кислота - 1200 мг, Аргинин - 640 мг, Цистеин - 204 мг, Аскорбиновая кислота - 120 мг, Сульфат цинка - 80 мг, Кальция пантотенат - 12 мг, Пиридоксин - 4 мг, Сульфат марганца - 4 мг, Фолиевая кислота - 400 мкг, Цианокобаламин - 2 мкгВспомогательные вещества содержание в 100 млГлицирризиновая кислота - 200 мг, Натрия метилпарабен (Е219)* - 100 мг, Экстракт зелёного чая - 25 мг, Экстракт корицы - 3 мг, Дистиллированная вода - до 100 мл* - индекс Е219 разрешён к применению как антимикробное соединение с консервирующим действием.

Форма выпуска

Раствор

Способ применения и дозы

Взрослые: по 25 мл два раза в день,дети от 14 лет: по 12,5 мл два раза в день. Для снижения риска инфекций – за 1 неделю до хирургического вмешательства и 1 неделю после, в периоды сезонных подъёмов заболеваемости ОРЗ. Для радио-, хемо- и гепатопротекции – с началом клинических или лабораторных проявлений побочных эффектов терапии и в течение не менее 2х недель по её окончании. Для восполнения микронутриентного дефицита – до восстановления полноценной диеты.Обратите внимание! ОНКОКСИН содержит глицирризиновую кислоту – природный тритерпеновый сапонин, который получают из корня солодки (лакрицы). Глицирризиновая кислота имеет выраженный сладкий вкус, поэтому некоторым пациентам ОНКОКСИН может показаться чрезмерно приторным. В таких случаях ОНКОКСИН следует развести водой или несладким соком и применять дробно в течение часа. Также может помочь питьё мелкими глотками через соломинку. ОНКОКСИН – это раствор, поэтому он может использоваться при эзофагите, стоматите, других проблемах, обусловленных лучевым поражением или химиотерапией, при которых приём твёрдой пищи причиняет боль.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость. или повышенная чувствительность к компонентам добавки, беременность, кормление грудью.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом месте