Инструкция по применению
Optimed Pro Active увлажняющий раствор для мягких контактных линз 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Оптимедсервис
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Pro Active Раствор Для Увлажнения Глаз При Ношении Контактных Линз (С Гиалуронатом Натрия) - раствор увлажняющий для мягких контактных линз (с гиалуронатом натрия) предназначен для увлажнения и регидратации мягких контактных линз при их ношении, обеспечивает мягкий увлажняющий и успокаивающий эффект, дает ощущение свежести и долговременный комфорт при ношении контактных линз. Не требует снятия линз перед применением. Раствор увлажняющий для мягких контактных линз (с гиалуронатом натрия) рекомендован для особо чувствительных глаз. Благодаря специальному увлажняющему комплексу, содержащему природные компоненты - эфир целлюлозы и гиалуронат натрия, и янтарной кислоте - природному антиоксиданту, раствор увлажняющий обеспечивает мягкое скольжение линзы по поверхности роговицы, длительное увлажнение и комфорт.

Состав

Раствор увлажняющий для мягких контактных линз (с гиалуронатом натрия) представляет собой стерильный водный раствор, который содержит натрий хлористый 0,7%, ЭДТА 0,02%, ПГМБ 0,001%, твин 80 0,0015%, этан 1,2-дикарбоновая кислота 0,003%, увлажняющие добавки: гиалуронат натрия 0,14%, натрий ГПМЦ 0,02%, глицерин 0,2%, боратный буфер.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Использование МКЛ (мягких контактных линз) -Длительное напряжение глаз -После оперативного вмешательства

Способ применения и дозы

По мере необходимости капните в каждый глаз по 1 или 2 капли. Для дополнительного комфорта используйте перед надеванием по 1 или 2 капли на каждую линзу. Для облегчения снятия и предотвращения повреждения линзы используйте перед снятием по 1 или 2 капли на каждую линзу.

Противопоказания

Необходимо соблюдать правила по уходу за линзами, рекомендованные Вашим врачом. Несоблюдение указаний может привести к серьезным заболеваниям глаз. Не использовать раствор в случае повышенной чувствительности к компонентам раствора.