Инструкция по применению
Оралсепт раствор для местного применения 240 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Македония
Производитель: Сэлвим
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бензидамин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,255 мг/1 доза

Действующее вещество

Бензидамин

Состав

активное вещество: бензидамина гидрохлорид — 0,150 г; вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат — 0,100 г, этанол (96%) — 10,000 г, глицерин (глицерол) — 5,000 г, ароматизатор мяты перечной 27198/14 — 0,100 г, натрия сахаринат — 0,024 г, полисорбат-60 (твин-60) — 0,005 г, натрия гидрокарбонат — 0,002 г, краситель хинолиновый желтый 70 (Е 104) — 0,002 г, индиготин 85% (Е 132) — 0,0001 г, вода очищенная до 100,0 мл.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При местном применении хорошо всасывается через слизистые оболочки и быстро проникает в воспаленные ткани, обнаруживается в плазме крови в количестве недостаточном для получения системных эффектов. Выводится, в основном, почками и через кишечник в виде метаболитов или продуктов конъюгации.

Показания

Симптоматическая терапия болевого синдрома воспалительных заболеваний полости рта и ЛОР-органов (различной этиологии): \-фарингит, ларингит, тонзиллит; \-гингивит, глоссит, пародонтоз, стоматит (в т.ч. после лучевой и химиотерапии); \-калькулезное воспаление слюнных желез; \- после лечения или удаления зубов; \-после оперативных вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти); \-кандидоз слизистой оболочки полости рта (в составе комбинированной терапии). При инфекционно-воспалительных заболеваниях, требующих системного лечения, препарат ОРАЛСЕПТ® используется в составе комбинированной терапии.

Способ применения и дозы

Применяется местно. 1 доза раствора составляет 15 мл (мерный стаканчик прилагается). Взрослым, больным пожилого возраста и детям старше 12 лет назначают для полоскания горла или полости рта по 1 дозе 2-3 раза в день. Применять неразбавленный раствор. Если при применении раствора возникает ощущение жжения, раствор следует предварительно разбавить водой (15 мл препарата и 15 мл воды смешать, используя мерный стаканчик). **_Курс лечения:_** при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки: от 4 до 15 дней; при одонто-стоматологической патологии: от 6 до 25 дней; после оперативных вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти): от 4 до 7 дней. **_Указания по применению:_** раствор используют для полоскания полости рта или горла в течение 20-30 секунд, а затем сплевывают; раствор нельзя глотать. При применении препарата в течение длительных сроков (более 7 дней) необходима консультация врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бензидамину или другим компонентам препарата. Детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных по исследованию на животных в отношении к эффектам во время беременности и в период грудного вскармливания недостаточно, а адекватных и строго контролируемых исследований у беременных женщин не проведено, кроме того, неизвестно проникает ли бензидамин в грудное молоко, следовательно, потенциальный риск для человека не может быть определен. При беременности и в период грудного вскармливания препарат ОРАЛСЕПТ® применяется только после консультации с лечащим врачом, в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Местные реакции: сухость во рту, чувство онемения, жжения в ротовой полости. _Аллергические реакции_: реакции повышенной чувствительности, включая кожную сыпь, кожный зуд, крапивницу, фотосенсибилизацию, ангионевротический отек, анафилактические реакции. _Прочие_: ларингоспазм. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

К настоящему времени о случаях передозировки препаратом ОРАЛСЕПТ® не сообщалось. Однако известно, что бензидамин при случайном попадании внутрь в высокой дозе (в сотни раз превышающей терапевтическую), особенно у детей, может вызвать возбуждение, судороги, тремор, повышенное потоотделение, атаксию и рвоту. Такая острая передозировка требует немедленного промывания желудка, восстановления водно-электролитного баланса, симптоматического лечения, адекватной гидратации. Если Вы приняли дозу больше рекомендованной, прополощите рот достаточным количеством воды, при появлении побочных реакций обратитесь к лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось. Не установлено фармацевтической несовместимости препарата ОРАЛСЕПТ® с другими лекарственными средствами.

Особые указания

При применении препарата ОРАЛСЕПТ® возможно развитие реакций гиперчувствительности. В этом случае рекомендуется прекратить лечение и проконсультироваться с врачом, для назначения соответствующей терапии. При наличии язвенного поражения слизистой оболочки ротоглотки, пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются в течение более трех дней. Применение препарата ОРАЛСЕПТ® не рекомендуется у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным противовоспалительным препаратам. Препарат ОРАЛСЕПТ® следует использовать с осторожностью у пациентов с бронхиальной астмой, так как в данном случае возможно развитие бронхоспазма. Следует избегать попадания раствора в глаза. При попадании раствора в глаза промойте их большим количеством воды. Следует обратить внимание спортсменов и водителей, что в составе препарата присутствует этанол.

Условия хранения

Хранить в защищённом от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.