Инструкция по применению
Орликс Таблетки 5 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Словакия
Производитель: Валента Фарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 24.0



Описание

Альфа-галактозидаза - фермент, расщепляющий так называемые олигосахариды (сложные сахара) до более простых форм, которые легко усваиваются. Бобовые, овощи, цельные злаки, отличаются высоким содержанием олигосахаридов, которые у большинства людей плохо усваиваются. Попадая в неизменном виде в толстый кишечник, олигосахариды сбраживаются бактериями с высвобождением избыточного количества газов, что приводит к вздутию, урчанию и боли в животе. Альфа-галактозидаза обеспечивает отсутствующую в организме человека ферментную активность, предотвращая поступление олигосахаридов в толстый кишечник в нерасщепленном виде.

Состав

Кальция гидрофосфата дигидрат (носитель), целлюлоза микрокристаллическая (носитель) кроскарамеллоза (носитель), альфа-га лактоз и да за, магния стеарат (агент антислеживающий). Не содержит ГММ, лактозы, молочных белков, красителей, ароматизаторов и консервантов.1 таблетка содержит 5 мг активного компонента альфа-галактозидазы, что соответствует 150 МЕ ферментативной активности галактозидазы. Энергетическая ценность на 1 таблетку: 0,1 ккал - 0,5 кДж. Пищевая ценность на 1 таблетку: Белки - 0,005 г жиры - 0,002 г, в том числе насыщенные жирные кислоты - 0,002 г углеводы - 0 г пищевые волокна - 0,058 г соль -0,001г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Биологически активная добавка к пище - источник пищеварительного фермента альфа-галактозидазы. Помогает предотвратить вздутие живота, вызванное употреблением в пищу продуктов, вызывающих метеоризм.зы.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 3 лет по 1-3 таблетки с первыми порциями пищи при употреблении продуктов, вызывающих метеоризм: всех видов фасоли (белой, красной, коричневой и их комбинаций), чечевицы, салатов, капусты (белой, красной), кольраби, брюссельской капусты, цветной капусты, брокколи, лука, чеснока, моркови, петрушки, муки и мучных изделий (особенно цельных семян зерновых), фисташек, семян кунжута, сои и соевых продуктов (соевого молока, тофу). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Перед применением БАД детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Детям до 14 лет принимать по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД.

Условия хранения

В сухом месте