# Инструкция по применению
# Эвалар ОРВИС Бронхо Тимьян Сироп 100 мл

## Характеристики




Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тимьяна обыкновенного травы экстракт
Количество в упаковке: 1

## Действующее вещество

Тимьяна обыкновенного травы экстракт

## Состав

Действующее вещество: Тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий * с содержанием тимола 0,028 % Вспомогательные вещества: Калия сорбат, лимонной кислоты моногидрат, колер карамельный, глицерол (глицерин), сорбитол жидкий (некристаллизующийся), вода очищенная. * Тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий получен из Тимьяна обыкновенного травы (Thymus vulgaris L., сем. яснотковых &ndash: Lamiaceae). Соотношение лекарственного растительного сырья к экстракту 1:2-2,5. Экстрагент: аммиак водный 25 %, глицерин 100 %, этанол 95 %, вода очищенная &ndash: в соотношении 1:42,5:162,5:294.

## Форма выпуска

Сироп

## Показания

В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе бронхит, трахеит, трахеобронхит, коклюш).

**Способ применения и дозы**

Внутрь, независимо от приема пищи. Если врач не назначил иной дозировки, то препарат принимают: Взрослые и дети старше 12 лет: 2-3 чайные ложки (10-15 мл) сиропа 3-4 раза в день. Дети от 5 до 12 лет: 1-2 чайные ложки (5-10 мл) сиропа 3-4 раза в день. Дети от 1 года до 5 лет: 1 чайная ложка (5 мл) сиропа 2-3 раза в день. Сироп можно принимать не разбавляя или разбавить водой. Длительность применения препарата определяется терапевтической необходимостью и продолжительностью заболевания.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, декомпенсация сердечного ритма, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, наследственная непереносимость фруктозы, дефицит сахаразы /изомальтазы, глюкозогалактозная мальабсорбция, детский возраст до 1 года.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания Препарат не рекомендуется принимать во время беременности и в период грудного вскармливания, в связи с отсутствием достаточного опыта клинического применения у данной категории пациентов.

**Побочные действия**

Возможно возникновение аллергических реакций. Из-за содержания сорбитола, при приеме препарата возможны раздражение слизистой оболочки желудка, диарея. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

**Передозировка**

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Лечение симптоматическое.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Препарат не следует одновременно применять с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

**Особые указания**

Вследствие содержания этанола детям до 12 лет следует принимать препарат по рекомендации и под наблюдением врача. Содержание этилового спирта в препарате не более 4%. В одной чайной ложке препарата (5 мл) содержится не более 0,16 г абсолютного этилового спирта (то есть безводного этилового спирта). Для детей от 1 года до 5 лет в максимальной разовой дозе содержится не более 0,16 г абсолютного этилового спирта, в максимальной суточной дозе - не более 0,48 г абсолютного этилового спирта. Для детей от 5 до 12 лет в максимальной разовой дозе содержится не более 0,32 г абсолютного этилового спирта, в максимальной суточной дозе - не более 1,28 г абсолютного этилового спирта. Для взрослых и детей старше 12 лет в максимальной разовой дозе содержится не более 0,48 г абсолютного этилового спирта, в максимальной суточной дозе - не более 1,92 г абсолютного этилового спирта. В 100 г препарата содержится 31,5 г сорбитола (в перерасчете на безводный сорбитол). В 1 чайной ложке сиропа (5 мл) содержится 1,85 г сорбитола, что соответствует 0,15 хлебных единиц. При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 3-5 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу.

**Срок хранения после открытия**

3

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 &deg:C. Хранить в недоступном для детей месте.