Инструкция по применению
ОРЗАКС Оушен Мульти, сироп, 150 мл

Характеристики

Форма выпуска: МЛ
Страна: Турция
Производитель: Bender Saglik Hizmetleri
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Ocean Multi (Syrup) — это сбалансированный витаминно-минеральный комплекс с Омега-3 (EPA/DHA), разработанный с учетом физиологических потребностей детей и подростков. Формула сочетает Омега-3 (EPA и DHA), поддерживающие функции мозга, зрения и нервной системы, с комплексом из 11 витаминов (A, E, D3, C, B1, B2, B6, B12, B3, B9, B5) и 5 минералов (селен, марганец, цинк, йод, молибден), которые обеспечивают поддержку обменных процессов, роста и адаптации к внешним нагрузкам. Ocean Multi (Syrup) рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов, минералов и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) Омега-3. Полезные свойства Ocean Multi (Syrup) • Способствует восполнению потребности в витаминах и минералах • Поддерживает иммунную и нервную системы • Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы • Поддерживает здоровье глаз • Поддерживает здоровье зубов, костей и суставов • Поддерживает когнитивные функции: память, концентрацию и внимание у детей

Состав

Размер порции: 10 мл Количество - % Дневной нормы Рыбий Жир - 500 мг - ** Витамин B1 - 1,1 мг - 100% Общий Омега 3 - 160 мг - ** Марганец - 1 мг - 50% Витамин C - 80 мг - 100% Витамин A - 500 мкг - 63% Витамин B3 - 16 мг NE - 100% Фолиевая Кислота - 200 мгг - 100% Витамин E - 12 мг a-TE - 100% Йод - 75 мкг - 50% Цинк - 7,5 мг - 75% Селен - 55 мкг - 100% Витамин B5 - 6 мг - 100% Молибден - 50 мкг - 100% Витамин B2 - 1,4 мг - 100% Витамин D3 - 10 мкг - 200% Витамин B6 - 1,4 мг - 100% Витамин B12 - 2,5 мкг - 100%

Форма выпуска

МЛ

Показания

Ocean Multi (Syrup) рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов, минералов и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) Омега-3.

Способ применения и дозы

Рекомендации по применению: детям 4 —10 лет — по 3 мл 1 раз в день во время еды, детям 11—17 лет — по 7 мл 1 раз в день во время еды. Необходимый объем отмерить дозатором.

Противопоказания

индивидуальная непереносимость компонентов, аллергические реакции на продукты пчеловодства, нарушения углеводного обмена, сахарный диабет, избыточная масса тела. Перед применением БАД детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Детям до 14 лет принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременным и кормящим грудью женщинам принимать БАД по рекомендации и под наблюдением врача.

Побочные действия

Возможна индивидуальная непереносимость отдельных компонентов. При появлении нежелательных реакций прием следует прекратить и обратиться к врачу.

Передозировка

В случае передозировки рекомендуется прекратить прием и обратиться к врачу. Возможные симптомы: тошнота, слабость, желудочно-кишечные расстройства. Меры: временно прекратить прием БАД; при необходимости — промывание желудка, прием активированного угля внутрь; симптоматическое лечение по назначению врача.

Взаимодействие с другими препаратами

Сведения о взаимодействии с лекарственными препаратами отсутствуют.

Особые указания

Дополнительные (особые) указания не предусмотрены.

Условия хранения

15-25 С