
Инструкция по применению
Осарбон Суппозитории вагинальные 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ацетарсол
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 250 мг+300 мг+300 мг
Срок годности: 36.0

Описание

Суппозитории торпедообразной формы белого или белого с желтоватым или светло-коричневатым оттенком цвета. допускается появление налета на поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

Действующее вещество

Ацетарсол

Состав

Один суппозиторий содержит: действующее вещество: ацетарсол (осарсол) — 250 мг, вспомогательные вещества: борная кислота, декстрозы моногидрат (глюкоза), жир твердый (Витепсол (марки H 15, W 35), Суппосир (марки NA 15, NAS 50)).

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Трихомонадный кольпит.

Способ применения и дозы

Предварительно освободив суппозиторий от контурной ячейковой упаковки, его вводят, лежа на спине, глубоко во влагалище. Применяют по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение 10 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, печеночная и/или почечная недостаточность, сахарный диабет, геморрагический диатез, туберкулез, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Аллергические реакции, гепатит, полиневрит.

Передозировка

При применении препарата Осарбон® интравагинально случаев передозировки не отмечалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата до настоящего времени не описано.

Особые указания

Применение препарата не влияет на управление транспортными средствами и работу с машинами и оборудованием.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении