
Инструкция по применению
Оспамокс гранулы для приготовления суспензии 250мг/5мл 60мл

Характеристики

Форма выпуска: Гранулы
Страна: Австрия
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Амоксициллин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 250 мг/5 мл



Описание

Гранулы для приготовления суспензии Оспамокс - антибиотик группы пенициллинов, аминопенициллин, разрушается пенициллиназой. Обладает широким спектром противомикробного действия.

Действующее вещество

Амоксициллин

Форма выпуска

Гранулы

Фармакокинетика

Практически полностью всасывается в тонком кишечнике (прием пищи не влияет на всасывание), Cmax достигается через 1–2 ч. Распределяется в тканях и жидкостях организма, включая мокроту и гнойный бронхиальный секрет, проникает в грудное молоко. При нормальной функции печени наблюдается высокая концентрация в желчи. T1/2 — 1–2 ч, выводится преимущественно почками (50% в активной форме).

Показания

Инфекции нижних (острый, хронический бронхит, пневмония, абсцесс легких, коклюш) и верхних дыхательных путей, ЛОР-органов, мочеполовых органов (острый, хронический пиелонефрит, пиелит, простатит, эпидидимит, цистит, уретрит, бессимптомная бактериурия во время беременности, гонорея), ЖКТ (брюшной тиф, паратиф, холангит, холецистит, шигеллез), кожи и мягких тканей, гинекологические (эндометрит и др.), лептоспироз, листериоз, инфекционный эндокардит, менингит, септицемия, профилактика хирургической инфекции.

Способ применения и дозы

Доза зависит от чувствительности возбудителя и локализации инфекционного процесса.Суточную дозу следует разделить на 2 (до 3-4) приема. Дозы для детей, рассчитанные на кг массы тела, не должны превышать максимальные дозы для взрослых. Средние дозы для взрослых и подростков - 1.5-2 г/сут, для детей - 30-60 мг /кг/сут.Лечение следует продолжать в течение 2-5 дней после исчезновения симптомов. Для предупреждения осложнений при стрептококковых инфекциях длительность лечения должна составлять по крайней мере 10 дней (рекомендации ВОЗ).При приготовлении суспензии флакон с гранулами следует наполнить питьевой водой, энергично встряхнуть, а затем долить водой до кольцевой отметки. Перед употреблением флакон с суспензией следует хорошо встряхнуть.